

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Strobilurín y Triazole.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

SAMU: 106

FSR CONSULTORES E.I.R.L.: 920 534 766

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido utilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

El producto **TOQUI** es un fungicida sistémico que combina dos ingredientes activos de diferente modo de acción, el tebuconazole que actúa interfiriendo la síntesis de ergosterol y el trifloxystrobin que actúa inhibiendo la respiración celular de los hongos. De acuerdo al modo de acción de ambos componentes, el producto se puede utilizar de forma preventiva, curativa y erradicante.

Aplicar con equipos terrestres, calcular la cantidad de agua a emplear, agregar en el tanque de mezcla la mitad del agua que se va a emplear, luego se adiciona la cantidad del fungicida **TOQUI** de acuerdo a la dosis recomendada, luego se agita la mezcla; finalmente se adiciona el resto de agua y se procede a la aplicación del producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

| Cultivo     | Plaga                        |                                       | Dosis       |             | P.C. | L.M.R.          |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------|-----------------|
|             | Nombre común                 | Nombre científico                     | Kg/Ha       | Kg/200L     |      |                 |
| Vid         | Oidio                        | <i>Erysiphe necator</i>               | 0.3 - 0.375 | -           | 14   | *3.0<br>**6.0   |
|             | Podredumbre gris / Moho gris | <i>Botrytis cinerea</i>               | 0.375       | -           |      |                 |
| Alcachofa   | Oidium                       | <i>Leveillula taurica</i>             | 0.3         | -           | 30   | *1.0<br>**0.6   |
| Ají Páprika | Oidium                       | <i>Leveillula taurica</i>             | 0.25        | -           | 3    | *0.4<br>**0.6   |
| Arroz       | Quemado del arroz            | <i>Pyricularia oryzae</i>             | 0.25        | -           | 35   | *1.5<br>**0.5   |
| Mango       | Antracnosis                  | <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> | -           | 0.06        | 60   | *0.01<br>**0.05 |
| Arándano    | Oidio                        | <i>Oidium sp.</i>                     | -           | 0.075 - 0.1 | 1    | *3<br>**1.5     |

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm)

\* Trifloxystrobin \*\* Tebuconazole

Gasto de agua en alcachofa: 200 a 600 L/Ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

- En el cultivo de Vid aplicar máximo 2 veces por campaña al año, en presencia de la plaga luego de haber efectuado una evaluación de campo y del cultivo.
- En el cultivo de Alcachofa, Páprika, Mango y Arándano, aplicar una vez por campaña al año, cuando se ha detectado la plaga en hojas. Cuando la planta está en desarrollo hasta el inicio de la floración.
- En el cultivo de Arroz se recomienda aplicar hasta 2 veces por campaña al año, con un intervalo de 15 días, con aplicaciones dirigidas a las hojas cuando estas muestren síntomas de la enfermedad durante el crecimiento vegetativo hasta el llenado de grano.
- El suelo debe estar en capacidad de campo. La planta debe estar turgente. No debe haber humedad sobre la lámina foliar.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingresar al área tratada hasta después de 24 horas de realizada la aplicación. En caso de ingresar antes de las 24 horas se debe usar ropa de protección.

**COMPATIBILIDAD**

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

**FITOTOXICIDAD**

A las dosis y momentos de aplicación indicados, **TOQUI** no es fitotóxico para los cultivos recomendados.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

