

Agry-Gent Plus[®] 5000

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

BACTERICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Gentamicin Sulfate	100 g/Kg
Oxitetracline hydrochloride	300 g/Kg
Aditivos	c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 2352 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:



SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU

Calle Coronel Andrés Reyes N° 360 Of. 401-A San Isidro, Lima 27 Perú.

Telf.: (511) 444-3096

Formulado por:

QUÍMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V

Calle 18 N° 20501, Esquina con Innovación,

Parque Industrial Impulso C.P. 31109 Chihuahua, Chih., México.

Telefax (614) 483-9000

CONTENIDO NETO : 160 gr

Numero de Lote :

Fecha de Formulación :

Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión)
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar juntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Gentamicinas y Tetraciclina.
- No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
- En caso de ingestión, No inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, remover ropa contaminada. Lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua manteniendo los párpados abiertos, por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Avisar al médico inmediatamente.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICA
CICOTOX 0800-13040 (Línea gratuita) O
ESSALUD 411-8000 (Anexo 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

“Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin”.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- “Peligroso para organismos acuáticos”.
- “No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos”.
- “No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto”.
- “Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros”.
- “Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada”.
- “El aplicador debe emplear toda las medidas necesarias para controlar la deriva”.
- “El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables”.
- “En caso de derrame, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas”.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AGRY GENT PLUS 5000[®] es un bactericida de uso agrícola que actúa inhibiendo la biosíntesis de proteínas en las bacterias fitopatógenas uniéndose irreversiblemente al ribosoma bacteriano además tiene un efecto sinérgico bacteriostático.

AGRY GENT PLUS 5000[®] penetra en la planta a través de los estomas y se transporta a través del xilema en forma acropétala a los puntos de crecimiento en donde se establecen y desarrollan las bacterias fitopatógenas.

AGRY GENT PLUS 5000[®] se aplica en pulverización manual, a motor o equipo tractorizado. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente, complete luego hasta el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

AGRY GENT PLUS 5000[®] se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña con 14 días de intervalo entre ellas para obtener un control eficaz. En el cultivo de papa, realizar una primera aplicación de **AGRY GENT PLUS 5000[®]** a los 45 días de la siembra y una segunda aplicación a los 60 de la formación de estolones.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con caldo bordales y cualquier otro producto de fuerte reacción alcalina o extremadamente ácida. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

No presenta síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		Dosis (g/cil de 200 L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Papa	“Pudrición blanda”	<i>Pectobacterium carotovorum</i>	160	28	0.01
Arroz	“Añublo bacterial del arroz”	<i>Burkholderia glumae</i>	160	28	0.01

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)

PC: Periodo de Carencia

