



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es Dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Lavar los equipos de aspersión con agua y con un detergente.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pirazolecarboxamide (Pydiflumetofen) + Triazole (Difenoconazole)
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800-13040
ESSALUD: 0801-10200
CISPROQUIM: 0800-50-847

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismo acuáticos
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



MIRAVIS® DUO

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA
FUNGICIDA AGRICOLA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC

Composición
Pydiflumetofen 75 g/L
Difenoconazole 125 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

PQUA N°..... - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal del Perú
Manuel Olguín 335 Of. 808, Urb. Los Granados
Santiago de Surco, Lima - Perú
Teléfono: 434-5600

Formulado por:
Syngenta Crop Protection AG
Switzerland

Importado y Distribuido por:
 **TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.**
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima- Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Contenido Neto: 200 Litros

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de productos que contienen el «+»
el logo SYNGENTA y el marco CP IRAM®
son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MIRAVIS® DUO** es un fungicida agrícola con acción sistémica y translaminar, que combina la acción de dos i.a.: Pidiflumetofen y Difenoconazol; la mezcla de estos dos fungicidas potencia la acción de dos sitios de acción, y disminuye el riesgo de resistencia cruzada con otras clases de fungicidas químicos (incluidos los grupos SDHI y DMI). Este compuesto tiene una actividad protectante y curativa sobre los patógenos indicados.
- Agitar bien el envase antes de utilizar el producto.
- Para la preparación, verter la cantidad de **MIRAVIS® DUO** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la cantidad de agua.
- **MIRAVIS® DUO** puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Cultivo	Plagas		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Tomate	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	3	*0.01/**2.0
	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1.0	3	*0.01/**0.8
Cebolla	Alternariosis	<i>Alternaria porri</i>	1.0	7	*0.01/**0.1

P.C.: Periodo de Carencia **L.M.R.:** Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)
* Pydiflumetofen / ** Difenoconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar en época de desarrollo vegetativo del cultivo y cuando las condiciones sean favorables al desarrollo de la plaga.
- Realizar como máximo dos aplicaciones por campaña con intervalo de aplicación de 7 días; considerando como máximo dos campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada sin equipo de protección antes de las 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

- **MIRAVIS® DUO** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. Se recomienda elaborar una pre-mezcla de pequeña escala para estudiar la compatibilidad de los productos.

FITOTOXICIDAD

- Siempre que **MIRAVIS® DUO** se aplique de acuerdo a las indicaciones que se dan, no se han reportado problemas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características fisico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.