

SIZE: 14.0 x 28.0 cm

18-12-2018

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados, el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30 °C.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- No es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc. llamar al médico mas cercano.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de ingestión provoque el vómito y consiga ayuda médica.
- En caso de emergencia llamar:

**CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o**  
**ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 o**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# SUBTILEX WP



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

#### COMPOSICIÓN

*Bacillus subtilis*.....556 g/Kg  
Aditivos.....csp 1 Kg

Registro PBUA N° 168 - SENASA

#### TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937. info@agrynova.com, www.agrynova.com

#### FORMULADOR:

WUHAN NATURE FAVOUR BIOENGINEERING CO., LTD

5/F TainHui Building, Huanzhong agricultural University

Wuhan. China. Telf: 86-027-87287550

#### IMPORTADOR:

AGRIMORPHO S.A.C

Mz.3, Lt.8, Dpto. 401, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo, La Libertad - Perú . Teléfono: +51 (044) 273330. info@isiore.com

#### DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo

Piura - Paita - Paita, Perú Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : 25 kg

Fecha de Vencimiento :

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- SUBTILEX WP** es un biofungicida que protege los cultivos contra enfermedades fungosas.
- SUBTILEX WP** contiene una cepa de la bacteria *Bacillus subtilis*, que brinda una acción antimicrobial. Actúa creando inicialmente una zona de inhibición en la hoja, previniendo la instalación del patógeno y destruyendo finalmente el tubo germinativo y micelio del hongo.
- Sistemas de preparación y aplicación:
  - En 3 a 5 litros de agua diluir la 200 a 500 cc de un encapsulador.
  - En la pre-mezcla (a) diluir la dosis específica recomendada de **SUBTILEX WP** y agitar muy bien (usar escobillón de lavar inodoro).
  - Llevar la mezcla (b) a 200L.

Es recomendable preparar la mezcla de 1 o 2 horas antes de la aplicación y usarse todo el producto pre mezclado antes de las 5 horas siguientes

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cultivo  | Enfermedad   |                           | Dosis    | PC   | LMR  |
|----------|--------------|---------------------------|----------|------|------|
|          | Nombre común | Nombre científico         | g /200 L |      |      |
| Pimiento | Oidium       | <i>Leveillula taurica</i> | 400      | N.A. | N.A. |

PC: Periodo de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

N.A.: No aplicable

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar **SUBTILEX WP** como preventivo cuando aun no se observan los síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Como curativo aplicar tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones cada 7 días.

#### PERIODO DE REINGRESO:

4 horas después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

#### COMPATIBILIDAD:

**SUBTILEX WP** no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino o con productos que tengan bactericida. Es compatible con la mayoría de plaguicidas, fertilizantes foliares y bio estimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

#### FITOTOXICIDAD:

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

*“El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”*



**PRECAUCIÓN**

