

SIZE: 16.0 x 21.0 cm

SUBTILEX WP



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Bacillus subtilis.....556 g/Kg
Aditivos.....csp 1 Kg

Registro PBUA N° 168 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera. Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937. info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADO POR:

WUHAN NATURE FAVOUR BIOENGINEERING CO., LTD

5/F TainHui Building, Huanzhong agricultural University

Wuhan. China. Telf: 86-027-87287550

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo Piura - Paita - Paita, Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com



Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : **25 Kg**

Fecha de vencimiento :

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

SIZE: 16.0 x 21.0 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados, el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30 °C.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

- No es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc. llamar al médico mas cercano.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de ingestión provoque el vómito y consiga ayuda médica.
- En caso de emergencia llamar:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o
ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 o
CISPROQUIM: 080-050-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

-**SUBTILEX WP** es un biofungicida que protege los cultivos contra enfermedades fungosas.

-**SUBTILEX WP** contiene una cepa de la bacteria *Bacillus subtilis*, que brinda una acción antimicrobial. Actúa creando inicialmente una zona de inhibición en la hoja, previniendo la instalación del patógeno y destruyendo finalmente el tubo germinativo y micelio del hongo.

-Sistemas de preparación y aplicación:

- En 3 a 5 litros de agua diluir la 200 a 500 cc de un encapsulador.
- En la pre-mezcla (a) diluir la dosis específica recomendada de **SUBTILEX WP** y agitar muy bien (usar escobillón de lavar inodoro).
- Llevar la mezcla (b) a 200L.

Es recomendable preparar la mezcla de 1 o 2 horas antes de la aplicación y usarse todo el producto pre mezclado antes de las 5 horas siguientes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Enfermedad		Dosis g /200 L	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Pimiento	Oidium	Leveillula taurica	400	N.A.	N.A.

PC: Período de carencia (días)
LMR: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)
N.A.: No aplicable

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **SUBTILEX WP** como preventivo cuando aun no se observan los síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Como curativo aplicar tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones cada 7 días.

PERIODO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación. Si se ingresa antes, debe hacerse con respirador con protección de vapores.

COMPATIBILIDAD

SUBTILEX WP no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino o con productos que tengan bactericida. Es compatible con la mayoría de plaguicidas, fertilizantes foliares y bio estimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

