

BREVIBAC WP



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Ingrediente activo:

Bacillus subtilis.....556 g/Kg

Aditivos.....csp 1 Kg

Registro PBUA N° 148 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

GOMEZ CARDONA ESDRAS ANTONIO

Mz.3, Lt.8, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo - Perú.

Teléfono: +51 (01) 2663828, +51 944696937. info@agrynova.com, www.agrynova.com

FORMULADOR:

WUHAN NATURE FAVOUR BIOENGINEERING CO., LTD

5/F TainHui Building, Huanzhong agricultural University

Wuhan. China. Telf: 86-027-87287550

IMPORTADOR:

AGRIMORPHO S.A.C

Mz.3, Lt.8, Dpto. 401, Urb. Los Jardines del Golf, Víctor Larco Herrera, Trujillo,

La Libertad - Perú . Teléfono: +51 (044) 273330. info@isiore.com

AGriMorpho S.A.C.

Mz 3 Lt. 8 Jardines del Golf Trujillo-Peru

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paita-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de Desarrollo

Piura - Paita - Paita, Perú Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com

Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : **25 Kg**

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

SIZE: 16.0 x 21.0 cm

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco. En almacenamientos prolongados, el producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 30 °C.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

- No es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc. llamar al médico mas cercano.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de ingestión provoque el vómito y consiga ayuda médica.
- En caso de emergencia llamar:

CICOTOX:0800-1- 3040 (atención las 24 horas) o
ESSALUD EN LINEA:0801-10200 o
CISPROQUIM:080-050-847

Nota al médico

DL50 oral aguda: > 5,000 mg/kg (rata)
DL50 dermal aguda: > 2,000 mg/kg (conejo)
ANTIDOTO
No existe antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes para evitar la deriva por el viento.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BREVIBAC WP es un biofungicida que protege los cultivos contra enfermedades fungosas.

BREVIBAC WP contiene una cepa de la bacteria *Bacillus subtilis*, que brinda una acción antimicrobial. Actúa creando inicialmente una zona de inhibición en la hoja, previniendo la instalación del patógeno y destruyendo finalmente el tubo germinativo y micelio del hongo.

Sistemas de preparación y aplicación

- En 3 a 5 litros de agua diluir el coadyuvante en la dosis recomendada
- En la pre-mezcla (a) diluir la dosis específica recomendada de **BREVIBAC WP** y agitar muy bien (usar escobillón de lavar inodoro).

Es recomendable preparar la mezcla de 1 o 2 horas antes de la aplicación y usarse todo el producto pre mezclado antes de las 5 horas siguientes.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **BREVIBAC WP** como preventivo cuando aun no se observan los síntomas de la enfermedad y/o las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo del patógeno. Como curativo aplicar tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad y repetir las aplicaciones cada 7 días.

PERIODO DE REINGRESO

4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BREVIBAC WP no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino o con productos que tengan bactericida. Es compatible con la mayoría de plaguicidas, fertilizantes foliares y bio estimulantes. Sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Plagas		Dosis g/200 L	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Arroz	Anubio bacterial	<i>Burkholderia glumae</i>	400 - 500	N.A.	N.A.
Banano	Sipatoka negra	<i>Mycosphaerella fiensis</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Cacao	Podredumbre morena	<i>Monilia fructicola</i>	300 - 500	N.A.	N.A.
Café	Roya del caféto	<i>Hemileia vastatrix</i>	300 - 500	N.A.	N.A.
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	300 - 500	N.A.	N.A.
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	400 - 500	N.A.	N.A.
Granada	Mancha negra de la hoja	<i>Alternaria alternata</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Holantao	Oidio de las leguminosas	<i>Erysiphe pisi var pisi</i>	300	N.A.	N.A.
Mandarina	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 500	N.A.	N.A.
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Pallo	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300 - 500	N.A.	N.A.
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	400	N.A.	N.A.
Quinua	Peronospora	<i>Peronospora farinosa</i>	300 - 400	N.A.	N.A.
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	250 - 300	N.A.	N.A.
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200 - 300	N.A.	N.A.

PC: Periodo de carencia en días

LMR: Límite máximo de residuos en ppm

N.A.: No aplica

