

POLYMAX WP

PLAGUICIDA BIOLOGICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN

Polioxina B.....100 g/kg

Aditivos.....csp 1Kg

Registro PBUA N° 222 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de

Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com

FORMULADOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de

Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com

DISTRIBUIDOR:

NOVAGRO-AG S.A.C.

Car. Paíta-Sullana Km. 3 Mza. B Lote. 13 Z.I. Zona Especial de

Desarrollo Piura - Paíta - Paíta, Perú

Teléfono: +51 (044) 273330

www.novagro-ag.com , ventas@novagro-ag.com



Fecha de Formulación :

N° de Lote :

Contenido Neto : 20 Kg

Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

PRECAUCIÓN

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO APLICACIÓN

- Usar ropa adecuada, mascarilla, guantes, botas y anteojos protectores durante la aplicación.
- No trate de limpiar el equipo de aplicación soplando directamente con la boca en cualquiera de sus partes.
- Ningún envase que haya contenido bio plaguicidas debe ser utilizado para contener alimentos y/o agua para consumo.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego destrúyalo.
- Debe guardarse en un lugar fresco y seco.
- Durante el transporte y almacenamiento, evitar roturas en los envases.
- No transportar ni almacenar junto con medicinas, alimentos o animales.
- Almacenar en un depósito adecuado y provisto de techo manteniéndolo bajo llave y lejos del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

- No causa irritación dermal ni ocular.
- No es un sensibilizante.
- No es tóxico para el hombre y no se han detectado síntomas específicos, en caso de sufrir síntomas de intoxicación tales como mareos, vómitos, etc. llamar al médico mas cercano.
- Después de la aplicación lavarse las manos y el resto del cuerpo con abundante agua y jabón.
- En caso que salpique la solución concentrada en los ojos, enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de ingestión provoque el vómito y consiga ayuda médica.
- En caso de emergencia llamar:

CICOTOX: 0800-1-3040 (atención las 24 horas) o

ESSALUD EN LINEA: 0801-10200 ó

CISPROQUIM: 080-050-847

NOTA AL MEDICO

DL₅₀ oral aguda: > 4640 mg/kg (rata)

DI₅₀ dermal aguda: > 2150 mg/kg (conejo)

ANTÍDOTO

No existe antídoto específico.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

POLYMAX WP es un potente fungicida biológico cuyo ingrediente principal es la polioxina B. Ésta causa la inhibición de la biosíntesis de la quitina de la pared celular de los hongos, evitando su desarrollo.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Disolver la dosis recomendada en 100 litros de agua, luego completar a 200 L.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

Cultivo	Enfermedad		Dosis (kg/200 L)	PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Mancha foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.3	N.A	N.A
Pimiento páprika	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	N.A	N.A
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	N.A	N.A
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.3 - 0.4	N.A	N.A
Cacao	Podredumbre morena	<i>Monilinia fructicola</i>	0.3 - 0.4	N.A	N.A
Café	Roya del cafeto	<i>Hemileia vastatrix</i>	0.3 - 0.4	N.A	N.A
Cebolla	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	0.3 - 0.4	N.A	N.A
Granado	Mancha negra	<i>Alternaria alternata</i>	0.3 - 0.4	N.A	N.A
Holantao	Oidium	<i>Erysiphe pisi</i>	0.3 - 0.4	N.A	N.A

PC: Última aplicación antes de cosecha (días)

LMR: Límite máximo de residuos (ppm)

N.A.: No aplicable

COMPATIBILIDAD

POLYMAX WP es compatible con productos de uso común.

FITOTOXICIDAD

No se observan efectos de fitotoxicidad de seguirse las recomendaciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

“El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.”

