

# Nimitz® 480 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**NEMATICIDA AGRÍCOLA**  
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN  
Fluensulfone ..... 480 g/L  
Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 2364-SENASA

Titular de Registro,  
Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
Av. El Derby N° 254 Of 503.  
Santiago de Surco. Lima - Perú.  
Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Makhteshim Ltd.**  
Neot Hovav Industrial Zone  
8551600. Israel.

Contenido neto: **4 Litros**  
Lote No.  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA NTES DE USAR EL PRODUCTO MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimento

### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Heterocyclic fluoroalkenyl sulfone.
- En caso de intoxicación. Llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa.
- Antídoto: No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-1-3040; ESSALUD en Línea (01)411-8000 anexo 4; ADAMA Agriculture Perú S.A.: (01)641-0000.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces, plantas acuáticas y semiacuáticas y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin, a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Nimitz 480 EC es un nematocida de acción por contacto, aunque su mecanismo de acción no está completamente elucidado, se conoce que presenta efecto inhibitorio de la movilidad en los nemátodos juveniles y posibles efectos en el comportamiento alimenticio. Nimitz 480 EC se aplica con equipo de pulverización terrestre (mochila o equipo adaptado a tractor) en bandas o a través del sistema de riego por goteo. La aplicación e incorporación uniforme al suelo es esencial para la eficacia del plaguicida.

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Melón	Nemátodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	2.0 - 4.0	N.A.	0.3
Vid*	Nemátodo del nudo de la raíz	Meloidogyne incognita	4.0**	100	0.8

P.C.: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

N.A. : No aplicable

\*Recomendación de uso exclusivamente para cultivos bajo sistema de riego por goteo.

\*\*Dosis efectiva (10,000 m2 aplicados).

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Realizar una (01) sola aplicación por campaña, considerando una (01) campaña por año. Aplicar como máximo 4 L/ha. Melón: Aplicar entre 7 a 10 días antes del trasplante y usar la dosis mayor en campos con historial de alta infestación. Vid: Aplicar inmediatamente después de la poda de producción (máximo hasta 3 días después).

### FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad en los cultivos y dosis recomendadas en la etiqueta. Riesgo de daño a las plántulas podría presentarse cuando no se respeta el tiempo mínimo de 7 días entre la aplicación y el trasplante del cultivo.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



cara

contracara

Dimensiones: 140 mm x 150 mm (por cara)  
Esta etiqueta necesita Hoja Informativa