

LEER ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ⚠ No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- ⚠ Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- ⚠ No almacenar ni transportar conjuntamente con medicinas, bebidas ni forrajes.
- ⚠ Utilice ropa protectora durante el mezclado, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- ⚠ Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- ⚠ Después de usar el producto, cambiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- ⚠ En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico mas cercano, mostrándole la etiqueta.
- ⚠ En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia, fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- ⚠ En caso de emergencia llamar al 3287398 CICOTOX.

NOTA AL MÉDICO

- ⚠ Glifolag 36 SL no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- ⚠ Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- ⚠ Realizar obligatoriamente el Triple Lavado del presente envase.
- ⚠ Devuelva el envase Triple Lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- ⚠ No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- ⚠ En caso de derrame recoger el producto y el material contaminado depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Glifolag[®] 36 SL

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Soluble (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Sal Isopropilamina de glifosato..... 485 g/L
Aditivos 640 g/L

Registro N° : PQUA N° 501-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRIPAC PERU SAC

Av. JOSE PARDO 223 INT. 41 - Miraflores - Perú
Teléfono: 444 - 3663

FORMULADO POR :

AGRIPAC S.A.

Kilometro 5.5 Vía Duran -Tambo Guayaquil -Ecuador
PBX: 593-4-2808262 FAX: 593-4-2807279



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BRENTAG PERU S.A.C.

Cal. los Plasticos Nro. 277

Industrial Vulcano (los Plasticos 267 - Puerta Garage)

Teléfonos : 00-51-1-3134800 /00-51-1-3134803

CONTENIDO NETO: 1000 Litros

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:



CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- ⚠ Agítense bien el envase antes de usar el producto.
- ⚠ Evite que la aspersión moje las paredes del cultivo.
- ⚠ Se emplea diluido en agua empleándose la proporción indicada en el cuadro de uso.
- ⚠ **Glifolag 36 SL** es un herbicida post-emergente de acción sistémica no selectivo para el control de malezas anuales y perennes.
- ⚠ No guardar la mezcla preparada para usarlo en días posteriores.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Malezas		DOSIS L/200L	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre científico			
Caña de azúcar	"Rabo de zorro" "Coquito" "Gramalote" "Pajilla"	<i>Setaria verticillata</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Panicum purpurascens</i> <i>Leptochloa filiformis</i>	2 a 3L/ 200 L	NP	2.0
	"Moco de pavo" "Botoncito"	<i>Echinochloa crusgalli</i> <i>Eclipta alba</i>			0.1
Mandarina	"Grama dulce" "Grama china" "Lechera" "Verdolaga" "Rabo de zorro" "Chamico" "Cadillo" "Pata de gallina" "Amor seco" "Capulí cimarrón"	<i>Cynodon dactylon</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Euphorbia spp.</i> <i>Pertulaca oleracea</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Datura stramonium</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physaloides</i>			0.5
Vid	"Yuyo" "Verdolaga" "Amor seco" "Capulí cimarrón"	<i>Amaranthus dubius</i> <i>Pertulaca oleracea</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Nicandra physaloides</i>			0.5
Esparrago	"Coquito" "Grama china" "Rabo zorro" "Cadillo" "Pata de gallina"	<i>Cyperus rotundus</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Setaria verticillata</i> <i>Cenchrus echinatus</i> <i>Eleusine indica</i>			0.1

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos
N.P.: No procede, es un herbicida que no se aplica sobre los cultivos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: La frecuencia depende del cultivo y del manejo de riesgo. Se aplica en plena época de mayor actividad fisiológicas de las malezas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es incompatible con herbicidas residuales como úreas sustituidas, triazinas u otros como herbicidas de tipo hormonal, como bipiridilos, fenoxis, organoarsénicos, etc.

FITOTOXICIDAD: No se ha observado fitotoxicidad sobre los cultivos tratados cuando se emplean las medidas agronómicas adecuadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico química del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.