

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DÁNINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Strobilurín y Triazole.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto:** Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y zapatos y bañarse con abundante agua y jabón.
- Teléfonos de emergencia:** SAMU: 106

FSR Consultores EIRL: 920534766

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.



Eminent Excell®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin	100 g/L
Tetraconazole	80 g/L
Aditivos.....	c.s.p... 1.0 L

Reg. PQUA N°2370- SENASA

Titular de Registro:

FSR CONSULTORES E.I.R.L.

Jr. Luis N. Sáenz 348, Int. 101,

Jesús María, Lima

Teléfono: 920534766

Formulador:

ISAGRO S.p.A.

Centro Uffici San Siro - Edificio

D ala 3 - Via Caldera, 21 -

20153.

Milano - Italia.

Teléfono: +39.02.40901.1

Distribuidor:

FSR CONSULTORES E.I.R.L.

Jr. Luis N. Sáenz 348, Int. 101,

Jesús María, Lima

Teléfono: 920534766

CONTENIDO NETO: 200 L

Lote N°:

F. Form.:

F. Venc.:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

EMINENT EXCELL es un fungicida sistémico con doble acción: preventiva y curativa. Actúa inhibiendo el desarrollo micelial, la división celular y el crecimiento de los hongos patógenos. El producto penetra por los tallos, yemas y hojas de la planta, gracias a su carácter sistémico y movimiento acropetal (hacia arriba).

EMINENT EXCELL se aplica mediante pulverizaciones con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Plaga		Dosis (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	0.4 - 0.6	42	*5.0 **0.05
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	0.6	7	*2 **0.5

PC: Período de Carenia. LMR: Límite Máximo de Residuos. *Azoxystrobin **Tetraconazole

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar en etapa de macollamiento para el cultivo de arroz y fructificación para el cultivo de vid. Asimismo, cuando la plaga esté presente.

Se recomienda aplicar 2 veces por campaña con un intervalo de 14 días y considerando 1 campaña/año, a fin de evitar la resistencia del patógeno.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente usados. Antes de hacer la mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa o maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

