

# Methomex®

## 20 LS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
 CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN: Methomyl 200 g/L, Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. N° 241-96-AG-SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
 Av. El Derby N° 254 Of 503.  
 Santiago de Surco. Lima - Perú.  
 Teléfono: (01) 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Maktheshim Ltd.**  
 P.O. Box 60  
 Beer Sheva 841001. Israel.

Contenido neto: **5 Litros**  
 Lote No.  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:



INFLAMABLE



NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
 DAÑINO**

Cara

Dimensiones: 150 mm x 140 mm  
 Esta etiqueta requiere Hoja informativa

### “LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO” “MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es DAÑINO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Carbamatos.
- Antídoto: Sulfato de Atropina
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Teléfonos de emergencia: CICOTOX 0800-1-3040; ESSALUD en línea (01) 411-8000 anexo 4; CISPROQUIM 080-050-847.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Methomex 20 LS es un insecticida carbamato de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Tiene rápida acción y se degrada rápidamente en el medio ambiente y las plantas, por lo que no requiere largos periodos de espera antes de la cosecha.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
		Conc (%)	L/ha		
ALFALFA	“Caballada” <i>Anticarsia gemmatilis</i>	0,4 - 0,5	2,0 - 2,5	7	0,02
MAÍZ	“Cogollero” <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,3 - 0,4	1,5 - 2,0	0	0,02
NARANJO	“Queresa redonda” <i>Selenaspidium articulatus</i>	0,2 - 0,3	-	7	1,0
TOMATE	“Gusano del fruto” <i>Spodoptera eridania</i>	0,4 - 0,5	2,0 - 4,0	1	1,0

PC: Periodo de Carencia LMR : Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Realizar las aplicaciones al inicio de la infestación de la plaga y repetir cada 10 días según el grado de re-infestación.

#### PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada durante 48 horas después de aplicado el producto a menos que se utilice ropa de protección.

#### COMPATIBILIDAD

Methomex 20 LS es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios, pero no con aquellos de reacción fuertemente alcalina.

#### FITOTOXICIDAD

No se ha observado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Contracara