

# KARIMBO®

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

### POLVO MOJABLE (WP)

#### COMPOSICIÓN:

Mancozeb..... 640 g/Kg  
Cymoxanil..... 80 g/Kg  
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 2404 - SENASA



**TITULAR DEL REGISTRO:**  
**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**  
Av. Javier Prado Este N° 6726 Int. 301-A  
Urb. Santa Patricia II Etapa, La Molina,  
Lima, Perú  
Teléfono: (01) 499-7831

**FORMULADO POR:**  
**POINT AGRO CHINA LMTD**  
Rm 1206 Kaisa Plaza, 1091 East  
Renmin Road, Jiangyin, Jiangsu  
China



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:**  
**AGROPECUARIA WJ & ANT. ALIS. LAS PALMERAS S.A.C.**  
Mz. F Lote 20 Asoc. Sr. de Los Milagros  
Tacna, Alto de la Alianza, Perú  
Teléfono: 952213521-944733849

**Contenido Neto: 1 Kg**

Número de Lote :  
Fecha de Formulación :  
Fecha de Vencimiento :

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

®Marca Registrada

## LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es tóxico por ingestión.
- Este producto es peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos ó agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Cymoxanil. Cyanoacetamide Oxime
- Mancozeb: Ditiocarbamatos.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de ingestión, No inducir al vómito a una persona inconsciente. solicitar ayuda, llamar al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, llevar a la persona a un lugar abierto y ventilado, brindar respiración artificial y llevar al paciente al médico.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**Teléfonos de Emergencia:**

**CICOTOX: (01) 328-7700**

**ESSALUD: (01) 411-8000 opción 4**

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.: (01) 499-7831**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de no menos de 5 metros.

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**KARIMBO** es un fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva y curativa.

Para la aplicación del producto, se debe llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada y completar con agua, mezclar uniformemente y aplicar sobre el área de la planta a tratar. Realizar la aplicación con un equipo de aspersión manual o mecánico, en óptimas condiciones.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

**KARIMBO** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo y cuando las condiciones climáticas sean favorables al patógeno. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

**KARIMBO** es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

#### FITOTOXICIDAD:

**KARIMBO** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en las etiquetas y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO  | ENFERMEDADES           |                               | DOSIS    |        | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |           |
|----------|------------------------|-------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|-----------|
|          | Nombre común           | Nombre científico             | Kg/ha    | g/200L |              | Mancozeb     | Cymoxanil |
| Papa     | "Rancha,Hielo fungoso" | <i>Phytophthora infestans</i> | 1 - 1.5  | 500    | 7            | 0.2          | 0.05      |
| Tomate   | "Rancha,Hielo fungoso" | <i>Phytophthora infestans</i> | 1.5 - 2  | 500    | 3            | 2.5          | 0.2       |
| Tomate   | "Mancha negra"         | <i>Alternaria solani</i>      | 1 - 2    | 500    | 3            | 2.5          | 0.2       |
| Pimiento | "Mancha negra"         | <i>Alternaria solani</i>      | 1 - 1.25 | 500    | 7            | 5            | 0.05      |

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

