

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

BEKRON

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate	100 g/kg
Lufenuron	400 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2372 - SENASA

Titular de Registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L

Jirón Luis N. Sáenz 348 Int. 101 - Jesús María - Lima

Teléfono: 920534766

Formulador:



Beijing YOLOO Bio-Technology Corp., Ltd.
Add: Darenwu Village, Yongdean Town,
Tongzhou District, Beijing, CHINA.
Tel. 86-10-53933269.
Fax. 86-10-8056021381363677

Importador y Distribuidor:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.
Telf.: 717-9040 / 717-9041
R.U.C. 20101637221
RU N° 141097

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 250 g.

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primas 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 , Teléf. del titular: 920534766

Consulte con un Ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/Ha	kg/200L		
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075	-	14	*0.01 **0.02
Pimiento (<i>Capsicum annum</i>)	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.08	-	7	*0.02 **0.8
Maíz (<i>Zea mayz</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.050 - 0.075	14	*0.01 **0.01

P.C. Periodo de carencia en días.

* Emamectin benzoate

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

** Lufenuron

Gasto máximo de agua para el cultivo de maíz es 375 L

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda aplica **BEKRON** hasta 2 aplicaciones por campaña / 2 campañas por año y una frecuencia entre aplicaciones de 14 a 21 días para los cultivos de espárrago y pimiento. Y para el cultivo de maíz aplicar 1 vez por campaña/1 campaña al año.

