

LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Triazole
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque elvómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos, con los párpados levantados.
- En caso de inhalación, lleve al paciente a un lugar ventilado. Si no respira aplicar respiración artificial.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

ESSALUD: 0801-10200
CROP BUSINESS SAC: 349-2669

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0800-13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o con suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para evitar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

SUPRAZOLE

200 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN:

Penconazole 200 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N°
Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por:
CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina

Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:
Contenido Neto: 4 L

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

RIDACHEM HONGKONG LIMITED
29-31 Chueng Lee St. Chaiwan Hongkong
CHINA



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

SUPRAZOLE 200 EW, es un fungicida sistémico con acción preventiva y curativa, que actúa inhibiendo la síntesis del ergosterol, inhibiendo la demetilación de los esteroles y con ello el desarrollo de la membrana celular de los hongos y ocasionando su muerte.

SUPRAZOLE 200 EW, se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P. C. (días)	L. M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200 L	L/Ha		
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.075	0.15	30	0.2
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.05-0.06	0.25 - 0.3	30	0.2

P.C.: Período de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuo (ppm: Partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- Aplicar máximo 3 aplicaciones/año; considerando aplicaciones no consecutivas del mismo plaguicida, y rotando con otros plaguicidas de diferente modo de acción.
- Dosis máxima de aplicación: Pimiento: 0.15 L/Ha. Vid: 0.3 L/Ha.

PERIODO DE REINGRESO: Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SUPRAZOLE 200 EW es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción fuertemente alcalina, ácidos u oxidantes.

FITOTOXICIDAD: SUPRAZOLE 200 EW no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

