

**“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”**

MAXIM 10% ST

**REGULADOR DE CRECIMIENTO DE PLANTAS
DE USO AGRÍCOLA**

**Tabletas Solubles (ST)
RCP N°061-SENASA**


Grupo Químico: Pyridine

Tipo de Formulación: Tabletas Solubles (ST)

Ingrediente activo (ISO): Triclopyr 10%

Nombre químico: 3,5, 6 - Tricloro-2-Pyridyl-oxiacetic acid

Fórmula estructural:



Fórmula empírica: $C_7H_4Cl_3NO_3$

Peso molecular: 256.463 g/mol

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto: Sólido, marrón/gris, sin olor característico

Estabilidad en el almacén: Estable durante un periodo de 2 años

pH: 6-8

No persistente en espuma

TITULAR DE REGISTRO:



ARYSTA LIFESCIENCE PERU SAC
Jr. Caracas 2226, Urb. Oryague
Jesus Maria - Lima, Perú

FORMULADOR:

THOMPSON & CAPPER

Hardwick Road, Astmoor Industrial Estate,
Runcorn, Cheshire, Reino Unido
Telephone: +44 (0)1928 573734

**“LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Pyridine

- En caso de inhalación, Trasladar al afectado al aire libre.
- En caso de ingestión, llamar inmediatamente a un médico.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón. Quitar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, Mantenerlos abiertos y lavar con abundante agua durante 15 minutos, consulte a un médico.
- No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX: 0800-13040, ESSALUD: 0801- 10200

Arysta LifeScience Perú S.A.C. : (511) 221-5729

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido deposite el envase en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos, ni tampoco fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MAXIM 10% ST actúa selectivamente en el reparto de la energía disponible del árbol, así como en la competencia entre órganos en crecimiento, provocando el aumento de la capacidad de desarrollo celular y la eliminación de frutos poco viables. Como consecuencia, **MAXIM 10% ST** provoca un aumento de la materia seca al interior de la célula, tiene mayor capacidad de entrar agua haciendo que el fruto se desarrolle más y a mayor velocidad.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS (Tabletas/ ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
NARANJA	Después de la caída natural de los frutos para mejora el tamaño y calidad de frutos	20 - 30	7	0.1

PC: Periodo de carencia L.M.R: Límite máximo de residuos

PRECAUCIONES EN LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

1. **MAXIM 10% ST** se puede aplicar con pulverizadora de espalda con boquillas o pitón y/o también nebulizadora.
2. Distribuir la solución en forma uniforme en el árbol, sin sobrepasar el punto de goteo.
3. Antes de efectuar la aplicación de **MAXIM 10% ST** calibrar los frutos del huerto según las recomendaciones de uso.
4. De cada 100 frutos calibrados, al menos el 85% deben cumplir con lo indicado en la etiqueta.
5. No aplicar si no ha finalizado la caída natural de los frutos
6. Siempre aplicar en árboles sanos y nutricionalmente equilibrados porque la aplicación producirá un incremento de los requerimiento de fertilizantes.
7. Aplicaciones en naranjos para evitar caída de fruta las aplicaciones se deben hacer cuando se produzca el cambio de coloración de la fruta.
8. Usar el volumen de agua adecuado según dosis dadas en la etiqueta.
9. En condiciones climáticas extremas, evitar el uso de este producto.
10. Para obtener un buen empleo, se debe leer las recomendaciones de uso.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar después de finalizada la caída natural de frutos. El diámetro del 85% de los frutos debe ser superior a 18 mm, equivalente a un diámetro medio entre 20 y 22 mm.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas las 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Evitar aplicar **MAXIM 10% ST** en mezclas con otros productos. Se puede mezclar con coadyuvantes, para mejorar el cubrimiento. Presenta incompatibilidades con productos muy alcalinos, aceites minerales, dinocap,dimetoato o dicofol.

FITOTOXICIDAD

No aplicar si no ha finalizado la caída natural de los frutos.
Siempre aplicar en árboles sanos y nutricionalmente equilibrados porque la aplicación producirá un incremento de los requerimiento de fertilizantes. No aplicar si no ha finalizado la caída natural de los frutos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

