

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cambiarse, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUIMICO: Acetarnidas y Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión enjuagar la boca y dar de beber agua. No provoque el vómito. No dar de beber agua al paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona con aire fresco. Aplicar respiración artificial si la respiración desciende o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Nota al médico:** No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 04100 - 1- 3040
Es Salud en línea (gratuita): 0801-10200 / 411- 8000 opción 4

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y déjelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- No botar en fuentes de agua, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar ríos, estanques u arroyos con los desechos y/o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MATA-RANCHA es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos Mancozeb (fungicida de contacto) y Cymoxanil (fungicida sistémico), se utiliza de manera preventiva, curativa y en pos-infección, además es erradicante.
Preparación:
Hacer una mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

MATA-RANCHA es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

MATA-RANCHA no es Tóxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas después de la aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R (ppm)	
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg /200 L	Kg/ha		Cymoxanil	Mancozeb
CEBOLLA	MILDIU	<i>Peronospora destructor</i>	0.5	-	7	0.5	1.0
PAPA	RANCH	<i>Phytophthora infestans</i>	0.5 - 0.75	-	15	0.5	0.3
QUINUA	a Mildiú	<i>Peronospora farinosa</i>	0.5	-	n.d.	n.d.	n.d
VID	Mildiú	<i>Plasmopara viticola</i>	-	2	10	5	5

* LMR: Límite Máximo de Residuos

*PC: Periodo de Carencia

*n.d.: no determinado

MATA-RANCHA

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cymoxanil 80 g/kg
Mancozeb..... 640 g/kg
Aditivos c.s.p1kg

Reg. PQUA N° 2343-SENASA

N° Lote
F. de Form.
F. Venc.

Importador y distribuidor:
ERÚ FÉRTIL E.I.R.L

Titular de Registro:
Andrey Liadine Herrera.
Dirección: Jr Venus 939. Lima

Jr. Manganeso 299 Zona Industrial Infantas
Los Olivos ,Lima- Perú

Formulado por:
NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD.
A-307 Wanda Center, No.102
Mid Jiangdong Rd., Nanjing, China 210019

Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**