LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas *e* n ciertas personas. - El producto es irritante para los ojos, le piel o el
- aparato respiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacénar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forraies.
- -Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cambiase, lave la ropa contaminada y bañase con abundante agua y jabón. -Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- GRUPO QUIMICO: Acetarnidas y Ditiocarbamatos En caso de intoxicación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión enjuagar la boca y dar de beber agua. No provoque el vómito. No dar de beber agua al paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración desciende o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con
- abundante agua fresca por 20 minutos.
 En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

Nota al médico: No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX 04100 - 1- 3040 Es Salud en línea (gratuita): 0801-10200- 4118000 CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido por 3 veces, inutilícelo el envase perforándolo y deposítelo en los lugares destinados para este fin.
- No botar en fuentes de agua, mucho menos en los

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época da floración.

- Peligroso para organismos acuatices
- No contaminar rica, estanques de arroyos con los desecho envases sucios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agu al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre permitir animales en el arca tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables. En caso de derrame recoger el producto y depositario e sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

 INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO MATA-RANCHA es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fung preventivo), que le brindan un efecto protectivo y curativo a planta. Se recorriendo usar **MATA-RANCHA** para el carbol enfermedades producidas por hongos oomycetos.

Hacer una are mezcla en una reducirla cantidad de agua, agitar den y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

MATA-RANCHA es compatible con la mayoría de plaguicidas d común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hace pequeña prueba *en* una reducida cantidad de agua antes de ha mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

MATA-RANCHA no es Mcdoxico usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma enfermedad del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas desp de la aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las característica floreo-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, e eficaz para los fines recomendados, si se usa y manej de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CHADDO DE HOOC.

CUADRO DE 0505.								
CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC	L.M.R (ppm)		
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg /200 L	Kg/ha	(días)	Cymoxanil	Mancozed	
CEBOLLA	MILDIU	Peronospora	0.5		7	0.5	1.0	
PAPA	RANCH	Phytophthora infestans	0.5 - 0.75	-	15	0.5	0.3	
QUINUA	a Mildiú	Peronospora farinosa	0.5	-	n.d.	n.d.	n.d	
VID	Mildiú	Plasmopara viticola	-	2	10	5	5	

MATA-RANCHA

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Cymoxanil	80 g/kg
Mancozeb	540 g/kg
Aditivos	c.s.p1kg

Reg. POUA N° 2343-SENASA

N° Lote F. de Form. F. Venc.

Contenido Neto:

Importador y distribuidor:



Jr. Manganeso 299 Zona Industrial Infantas Los Olivos ,Lima- Perú

Formulado por: NANJING HAIGE CHEMICAL CO. LTD, A-307 Wanda Center, No.102 Mid Jianadona Rd., Nanjina, China 210019

Contenido neto: 1 L

NOCORROSIVO

NOEXPLOSIVO NOINFLAMABLE































