

# Medidas 250ml: SIN MEDIDAS FEBRERO 2020 AG



PANTONE 293 C

PANTONE 721 C

PANTONE 431 C

PANTONE PROCESS BLACK PC

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Fluazinam: Phenylpyridiamine; Cymoxanil: Cyanoacetamide oxime
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administre nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Báñese con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retire a la persona del área contaminada y trasládelas a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

## TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CIPROQUIM: 0800-5-0847  
CENTRO NACIONAL DE EMERGENCIAS ESSALUD: 0801-10200  
MONTANA: 419-3000



# Efectus®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

## COMPOSICIÓN:

Fluazinam ..... 250 g/L  
Cymoxanil ..... 200 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

Reg. PQUA N° 2379 - SENASA

Titular de Registro: MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por:

MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210 Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú.

Central Telefónica: (511) 4193000

www.corpmontana.com

Contenido Neto: 500 mL

Lote N°:

Fecha de Form:

Fecha de Exp.:



NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**EFFECTUS** es un fungicida que contiene dos ingredientes activos complementarios para un control sobre la racha. Fluazinam es un fungicida preventivo, de contacto y que resiste el lavado por lluvias o rocio. Presenta un modo de acción multi sitio que actúa interrumpiendo la formación de energía en varios sitios metabólicos dentro de la célula del patógeno ya que inhibe la germinación de esporas, la formación de apresorios, la penetración y el crecimiento de las hifas y la esporulación de los patógenos en las plantas. Cymoxanil es un fungicida que previene la germinación de esporas, formación de haustorios y el crecimiento micelial del patógeno. Cymoxanil tiene una actividad sistémica con acción transaminar, cuando es aplicado a la superficie superior de las hojas, penetra en ellas controlando las infecciones de la parte inferior.

**EFFECTUS** se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o ¼ partes de su capacidad, agitar bien el envase del producto y hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente aparte, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA        |                               | DOSIS       |             | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm)         |
|---------|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|
|         | Nombre Común | Nombre Científico             | (L/200L)    | (L/Ha)      |              |                      |
| Papa    | Rancha       | <i>Phytophthora infestans</i> | 0.30 - 0.50 | -           | 7            | 0.02(*)<br>0.05 (**) |
| Vid     | Mildió       | <i>Plasmopara viticola</i>    | -           | 1.25 - 1.50 | 28           | 0.3(*)<br>0.01 (**)  |
| Cebolla | Mildió       | <i>Peronospora destructor</i> | 0.30 - 0.40 | --          | 21           | 0.20(*)<br>0.05 (**) |

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

Fluazinam (\*), Cymoxanil (\*\*)

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

