

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- ## MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- 20190226



FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Aditivosc.s.p. 1L

Reg. PQUA N° XXXX - SENASA

Titular del registro: HORTUS S.A.

Calle Sucre N° 270, Ate. Lima, Perú.

Formulado por:



IPROCHEM CO., LTD.

35Floor, Guomao Business Mansion,
No.3005, Nanhu Road, Luohu District,
Shenzhen, China
Teléfono: +86-755-25195287

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú.

Telf: 717-9040 / 717-9041

R.U.C. 20101637221

RU N° 141097

Contenido Neto: 1 L

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

FUNGO STOP es un fungicida sistémico, para el control del moho gris. **FUNGO STOP** Interrumpe la reproducción celular del hongo al interferir la síntesis de la proteína llamada tubulina que se requiere en la meiosis y mitosis.

FUNGO STOP se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización, accionado manual o mecánicamente. El suelo debe estar en capacidad de campo y la planta debe estarurgente. Realice una pre mezcla en agua acondicionada a pH 5.5 – 6.0. Vierta la pre mezcla en el tanque de aplicación, con el sistema de agitación en funcionamiento. Asegúrese del buen funcionamiento del equipo de aplicación, poniendo especial énfasis en el sistema de agitación. Añada un buen adherente dispersante. Aplique con suficiente volumen de la mezcla para lograr una buena cobertura.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Fresa	Podredumbre gris / Moho aris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	14	0.01

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda usar **FUNGO STOP** una sola aplicación por campaña como máximo, considerando una campaña por año. El producto se usa cuando se ha detectado la presencia de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO: ingresar al área tratada 24 horas después de realizadas las aplicaciones.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con un número de pesticidas, incluyendo fungicidas que tienen contenido de cobre y con materiales que presentan alta alcalinidad. Es un agente quelante, que une muchos metales incluyendo hierro, pero no calcio.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

