LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE. FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

·Este producto es de cuidado, no ingerir

· Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión

·Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado

·Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrales,

· Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

·Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

· Grupo químico: Carbazate

·En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro de salud y mostrarle la etiqueta y/o hoja

En caso de ingestión, no provogue al vómito. No administrar nada por vía oral, si la persona está inconsciente o padece

•En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. •En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa y el calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Aplicar respiración artificial

· Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 411-8000 (opción 4) SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

· Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

·Tóxico para abeias v artrópodos benéficos.

·No aplicar en presencia de polinizadores.

·No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

· Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.

· Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

· Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

















PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

Composición:

Bifenazate: 500 g/L Aditivos: c.s.p. 1L

Registro PQUA Nº 2390 - SENASA



Titular del Registro: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: 20L

Nº de Lote: F de Form F de Venc Importado v Distribuido por: SILVESTRE PERÚ S.A.C.

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis. Nanjing 211100 CHINA.

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

GRIMPER® 500 SC es un acaricida selectivo de acción por contacto directo, durante la aplicación, y posteriormente ofrece un efecto

GRIMPER® 500 SC se aplica mediante pulverizadores con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcia de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen de la aplicación. El suelo del cultivo debe estar en capacidad de campo. Ablicar GRIMPER® 500 SC sobre plantas limpias y sin polyo para incrementar la eficacia del producto. Realizar un lavado previo a las plantas antes de la aplicación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/200L	(días)	(ppm)
FRESA	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.1	8	0.2
PALTO	Ácaro	Oligonychus punicae	0.1	14	7

P.C.: Periodo de Carencia

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar luego de una evaluación, cuando la densidad de plaga lo justifique.

Aplicar solo 1 vez por campaña, considerando 1 campaña/año.

Aplicar como máximo 1 litro por hectárea.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBIL IDAD

GRIMPER® 500 SC es compatible con la mayoría de plaquicidas de uso común excepto con aquas carbonatadas y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD

GRIMPER® 500 SC no es fitotóxico para los cultivos recomendados, si se sigue las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneia de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



































