

ITABENDAZOLE 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCETRADA (SC)

Composición:

Thiabendazole.....500 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L


Registro PQUA N°2281 SENASA

Titular del registro: Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A.

Formulador: Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co., Ltd.

Room 10, Floor 4, 1398 Jinqiao Road, Pudong District, Shanghai, China

Teléfono: +86-21-50395038



Importador y Distribuidor: Industria Tecnológica Agrícola Del Peru S.A.

Av. Javier Prado Este 6210 Of. 201, La Molina, Lima – Perú

Teléfono +51 349-6805

Fecha de formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 100 ml

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU 106

Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805



CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Vid.	Prodredumbre gris / Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	4	0.05
Páprika	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	300	3	2
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	150	15	15

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar **ITABENDAZOLE 500 SC** como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid.

Para el cultivo de pprika, se recomienda una (01) aplicacin por campaa y considerar 02 campaa por ao.

Para el cultivo de palto, se recomienda 01 aplicacin por campaa, considerando 01 campaa por ao en la etapa de brotamiento.

Se recomienda aplicar **ITABENDAZOLE 500 SC** preventivamente o tan pronto se observen los primeros sntomas de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las caractersticas fsico qumicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aqu recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor informacin comunquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORA TOXICOLGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO**