

1.0 ± 0.2
20.7 ± 0.3 cm
0.9 ± 0.2

3.5 ± 0.3 cm
0.8 cm

**ITABENDAZOLE** 500 SC  
**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

Composición:  
Itabendazole.....500 g/L  
Aditivos.....c.s.p. 1L

**Registro: PQUA N° 2281-SENASA**  
**Cont. Neto: 100 ml**

**Importado y Distribuido por:**  
**ITAGRO S.A.**  
Calle 10 de Agosto, 1000  
Montevideo

**Formulador:**  
**ITAGRO** Lion Agro Uting Bai Co., Ltd  
No. 18, Second Hailin Road,  
Chemical Industrial Park, Yangtze Coastal  
Economic Development Zone, Rubong  
County, Jiangsu, China

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**  
\*Este producto es de USO AGRÍCOLA. No ingerir.  
\*Evitar el contacto con la piel.  
\*Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**  
\*Ojos: En caso de irritación, lavar con abundante agua y jabón.  
\*En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.  
\*En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padeciendo convulsiones.  
\*En caso de contacto con los ojos: lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.  
\*En caso de contacto con la piel: retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.  
\*En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.  
\*Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU 105  
Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 348-8805

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSES ml/ha	P.C. (días)	L.M.R. (g/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PIÑA	Chupada (larva)	Spodoptera litura	300	15	150
PLÁTANO	Morla (larva)	Leucophaea bucolana	15	15	15
VIDA	Podrido por Moho gris	Botrytis cinerea	300	4	0.05
PLÁTANO	Morla	Spodoptera litura	300	15	150

**F.F.C.:** Periodo de carencia en días. **L.M.R.:** Límite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**  
Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid. Para el cultivo de paprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar (02) campañas por año. Para el cultivo de plátano, se recomienda (01) aplicación por campaña, considerando (01) campaña por año en la etapa de brotamiento. Para el cultivo de papa se aplica ITABENDAZOLE 500 SC considerando máximo (01) aplicación por campaña y (02) campañas por año. Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**  
El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4**  
**LIGERAMENTE PELIGROSO**

**ATENCIÓN**

**LOGO ITAGRO**



**C82 M7 Y86 K0**



**C82 M7 Y86 K0**

**T. LAVADO**



**PANTONE 343 C**

**B. TOXICOLÓGICA**



**PANTONE 293 C**

**Logo producto**

**TEXTO**



**P. Process Black**