"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

ITABENDAZOLE 500 SC

PLAGUICIDA OUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCETRADA (SC)

Composición:

Thiabendazole……..……..……..500 g/L

Aditivos…..……..……..…..c.s.p. 1L

Registro PQUA N°2281 SENASA

Titular del registro: **Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A.**

Formulador: Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co., Ltd.
Room 10, Floor 4, 1398 Jinqiao Road, Pudong District, Shanghai, China
Teléfono: +86-21-50395038

Importador y Distribuidor: Industria Tecnológica Agrícola Del Peru S.A.
Av. Javier Prado Este 6210 Of. 201, La Molina, Lima – Perú
Teléfono +51 349-6805

Fecha de formulación:
Lote:
Contenido neto: **250 ml**
Fecha de vencimiento:

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

ATENCIÓN

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
•Este producto es de CUIDADO, No ingerir.
•Peligroso si es inhalado.
•Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
•Grupo químico: Benzimidazol
•En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centre médico y mostrarle la etiqueta.
•En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
•En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
•En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
•En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
•Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX (511) 619-7090
SAMU 106
Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Vid	Pudrición gris / Moho gris	*Botrytis cinerea*	300	4	0.05
Páprika	Marchitez	*Fusarium oxysporum*	300	3	2.00

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar **ITABENDAZOLE 500 SC** como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid.
Para el cultivo de páprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar 02 campañas por año.
Se recomienda aplicar **ITABENDAZOLE 500 SC** preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA