PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCETRADA (SC)

Composición:

Thiabendazole......500 g/L Aditivos......c.s.p. 1L

Registro PQUA N°2281 SENASA

Titular de registro:

▶ CIEETR→科技看限2月

Barghii Nahay Gunisai Jedushy B. Dil

Industria Tecnológica Agrícola del

Perú S.A

Formulador:

Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co., Ltd.

Room 10, Floor 4, 1398 Jinqiao Road, Pudong District, Shanghai, China Teléfono: +86-21-50395038

Importador y Distribuidor:

ITHURO:

Industria Tecnológica Agrícola Del Peru S.A.


Av. Javier Prado Este 6210 Of. 201. La Molina, Lima – Perú Teléfono +51 349-6805

Nocivo en caso de Ingestión Nocivo en contacto con la piel Nocivo si se inhala

Nombre común ISO: THIABENDAZOLE Nombre IUPAC: 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole Grupo químico: Benzimidazole

CAS: 148-79-8 Formula quimica: C10H7N3S Peso molecular: 201.25

Fórmula estructural:



Presentaciones:

Frascos de 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 5L y 200L

Matrerial plástico COE CIUSIVO

CATEGORIA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO



ATENCIÓN



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCAN TE SELOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

PRECAUCONES Y ADVENTENCIAS DE USO Y AMELICACION

"Este producto es de CUIDADO, No ingerin.

"Peligraso i ses inhalisto.

"Conserversu producto en su envise original, bien tapado y etia praco.

"Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, para y en llado.

"No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, y edicionas, bebidas ni forrejes.

"Utilize pop protectora durante el manipuleo y la aplicación agente ingresor el áres trateda en las primeres 24 horas. «Utilice rops protectore durante es mangacas y activados atribudades de la aplicación.
Después de las relipidados cámbiese, levaje respectaráminada y bañese con abundante agua y jabor.
Ningún en asse que heya contenido plaguados de la utilicarse para conservar alimentos o aqua para consumo.
Realice la splicación siguiendo la dirección despento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIO

INSTRUCCIONES DE PRIMETANS E CASA GRAPO QUINTOS E PRIMETANS E PRIM

leventados.

En caso de crimario coma piel rebrer la rope contaminede. Beñerse con abundante agus y jabón.

En caso de crimario coma piel rebrer la rope contamineda. Beñerse con abundante agus y jabón.

En caso de inhalación retirer a la persona del área contamineda y tresladada a un ambiente ventilado. Brinder respiradion polítical si úera necesario.

"Antidoto agla doucto no tiene antidoto específico. El tralamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX (511) 619-7000

SAMU 106

Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS *Después de usar el contenido, enjuague les acces este envase y vierta la solución en la mezota de aplicación yluego inutilizato hiturándolo o perforándolo, y depositato en el lugar destinado por las autoridad es perseste fin.
*Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

*Devuelva el envase trole lavado el centro de scopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

·Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar nica, estanques o emoyos con los desechos o envases vacios.

No contaminar las fueltes de agus con los restos de la aplicación o cobrantes del producto.

"Respetar una banda de no epicación hacia carepos de agua de al manos 10 metros.

"Pelignoso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área trabada.

"El aplicador deberá enplear todas las medidas necesarias para contolar la denia. "En caso de demames recoger inmedialamente el producto y depositado en un lugar seguro a fin de evitar su limiviación hacia aquas subtemáneas.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ITABENDAZOLE 500 SC está compuesto por thiabendazol que es un fungicida sistémico del grupo de los

penzimiaezoies. Para la preparación, diluir la dosis de ITABENDAZOLE 500 SC a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hesta obtener una solución estable y completar la otre mitad con agua. En caso utilice un surfactante no ionico, añadalo al último y vuelva a agitar. ITABENDAZOLE 500 SC puede ser usado aplicado con cualquier equipo terrestre, pulvenzadora menual, atomizadora o equipo tractorizado y provisto de boquillas adecuadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	Nombre comun	Nombre técnico	(L/200L)	(días)	(ppm)
Vid	Prodredumbre gris / Moho gris	Botrytis cineres	300	4	0.05
Paprika	Marchitez	Fusarium oxysporum	300	3	2.00

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo

Para el cultivo de paprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar 02 campañas por año

nienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros sintomas de la

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación.

TRABENDAZQLE 500 SC puede ser mezclado con la mayoria de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados, en caso de dudas se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad.

En oriconomia.

La eplicación de Dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo.

Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.







































