

ITABENDAZOLE 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCETRADA (SC)

Composición:

Thiabendazole.....500 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L


Registro PQUA N°2281 SENASA

Titular del registro: Industria Tecnológica Agrícola del Perú S.A.

Formulador: Shanghai Maiheng Chemicals Technology Co., Ltd.

Room 10, Floor 4, 1398 Jinqiao Road, Pudong District, Shanghai, China

Teléfono: +86-21-50395038



Importador y Distribuidor: Industria Tecnológica Agrícola Del Peru S.A.

Av. Javier Prado Este 6210 Of. 201, La Molina, Lima – Perú

Teléfono +51 349-6805

Fecha de formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 250 ml

Fecha de vencimiento:

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL

NOCIVO SI SE INHALA



ATENCIÓN

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU 106

Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805



CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico			
Vid.	Prodredumbre gris / Moho gris	Botrytis cinerea	300	4	0.05
Páprika	Marchitez	Fusarium oxysporum	300	3	2
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	150	15	15

P.C.: Periodo de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid.

Para el cultivo de páprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar 02 campañas por año.

Para el cultivo de palto, se recomienda 01 aplicación por campaña, considerando 01 campaña por año en la etapa de brotamiento.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

