$^{1}1.0 \pm 0.2$ 0.9 ± 0.2

တ 0

0.3

6.0



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de CUIDADO, No ingerir.
 Peligroso si es inhalado.
 Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Benzimidazol
 En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico

y mostrarle la etiqueta. En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados. •En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y

Ten dass de comissos de comissos de la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente en caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

-Antidoto: Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU 106 Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805



Chupadera fungosa/ Rhizoctoniasis Muerte regresiva

P.C.: Periodo de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

Marchitez

PÁPRIKA

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC como máximo una (01) aplicación por campaña por año para
el cultivo de vid. Para el cultivo de páprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar 02

campañas por año.

Para el cultivo de pallo, se recomienda 01 aplicación por campaña, considerando 01 campaña por año en la etapa de brotamiento.

Para el cultivo de papa se aplica ITABENDAZOLE 500 SC considerando máximo 01 aplicación por campaña Para el cultivo de papa se aplica ITABENDAZOLE 500 SC considerando máximo 01 aplicación por campaña


y 02 campañas por año. Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros sintomas de la enfermedad.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las ancitadas en la efiqueta y que es eficaz para lo fines aqui recomendados, el se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuniquese con el titular de registro o con el distribución del producto.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO

LOGO ITAGRO







Logo producto TEXTO P. Process Black