

11.0 +/- 0,3 cm

1.6 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de CUJADADO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado.
- Conservar su producto en su envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y la aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con agua por lo menos durante 15 minutos cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel retirar la ropa contaminada. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU 106
Titular del registro: ITAGRO S.A. +51 349-6805

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador deberá emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames recoger inmediatamente el producto y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



ITABENDAZOLE 500 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCETRADA (SC)

Composición:

Thiabendazole.....500 g/L

Aditivos.....c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 2281-SENASA**Titular del Registro:**

Importado y Distribuido por:

ITAGRO S.A.

Av. Javier Prado Este 6210.Of. 201
La Molina - Lima
Tel: (01) 349-6805

Formulador:

Lion Agrevo (Jiang Su) Co., Ltd
No. 16, Second Haitan Road,
Chemical Industrial Park, Yangkou
Coastal Economic Development Zone,
Rudong County, Jiangsu, China

Contenido Neto: 500 mL

N° de Lote:

F. de Form.: "Ver parte superior"

F. de Venc.:

Nocivo en caso de Ingestión

Nocivo en contacto con la piel

Nocivo si se inhala

**ATENCIÓN**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ITABENDAZOLE 500 SC está compuesto por thiabendazol que es un fungicida sistémico del grupo de los benzimidazoles.

Para la preparación, diluir la dosis de ITABENDAZOLE 500 SC a utilizar, en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una solución estable y completar la otra mitad con agua. En caso utilice un surfactante no iónico, añádale al último y vuelva a agitar. ITABENDAZOLE 500 SC puede ser usado aplicado con cualquier equipo terrestre, pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado y provisto de boquillas adecuadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS ml/200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
PAPA	Chupadera fungosa/ Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	300	90	0.04
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	150	15	15
VID	Podredumbre gris/ Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	300	4	0.05
PÁPRIKA	Marchitez	<i>Fusarium oxysporum</i>	300	3	2

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC como máximo una (01) aplicación por campaña por año para el cultivo de vid.

Para el cultivo de páprika, se recomienda una (01) aplicación por campaña y considerar 02 campañas por año.

Para el cultivo de palto, se recomienda 01 aplicación por campaña, considerando 01 campaña por año en la etapa de brotamiento.

Para el cultivo de papa se aplica ITABENDAZOLE 500 SC considerando máximo 01 aplicación por campaña y 02 campañas por año.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

Se recomienda aplicar ITABENDAZOLE 500 SC preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

LOGO ITAGRO

C82 M7 Y86 K0



C82 M7 Y86 K0

T. LAVADO

PANTONE 343 C

B. TOXICOLÓGICA

PANTONE 293 C

Logo producto

P. Process Black