

Etiqueta **PROBAC** x 1L 28.7cm x 15cm COEX 28.04.22

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrela la etiqueta.

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg
DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase de haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente,
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas u organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación en ríos, ríos u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Bacillus subtilis, Ceba ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1×10^{12} unidades formadoras de colonia (UFC)..... 2%

Aditivos 98%

Req. PBUA N° 136 SENASA

Titular de Registro, Formulador, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2, Of. C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachina Est.
San Antonio - Huachinirí, Lima
Central: (01) 514 1500



Fecha de Formulación:


Nº de Lote:

Contenido neto:1L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN



Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el producto en el agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que se aplique gota en gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de 510-Stic® adicional de 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección a la degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre científico	DOSIS L/cil	P.C. (Días)	L.M.P. (p.p.m)
Vino	Oidium	Uncinula necator	1.5 - 2	N.A.
Esparrago	Mancha purpura	Stemphylium vesicarium		
Problema	Oidium	Leveillula taurica		
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1.0 - 1.5	
Arándano*	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2	
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2	

P.C.: Periodo de carencia

LMR: Límites máximos de residuos

N.A: no aplica

* Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.

Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomicina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

