1 cm
Sin UV

Ampliación uso Arandano

Etiqueta **PROBAC x** 1L 28.7cm x 14.5cm 04.06.24

1 cm
Sin UV

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
-En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 / CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
-Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
-Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
-El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
-El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
-No lavar los envases ni equipo de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROBAC BS ®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN :

Bacillus subtilis, Cepa ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1 x 10^{12} unidades formadoras de colonia (UFC)..... 2%
Aditivos 98%

Reg. PBUA N° 185 - SENASA

Titular de Registro, Formulador, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A
Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este, San Antonio - Huarochiri, Lima.
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO S.A
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto:1L
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
PROBAC BS (*Bacillus subtilis* Cepa ULTRAQ-07) es un producto de contacto, tiene efectos antagónicos hacia patógenos de los cultivos que se indican en el cuadro de usos. Por efecto de exclusión competitiva de nutrientes y espacio.
Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar "escorrentía" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de BIO-stick adicionando 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección a la degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	U.A.C (días)	L.M.R (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico	L/Cil		
Vid	Oidium	*Uncinula necator*	1-2	N.A.	N.A.
Esparrago	Mancha purpura	*Stemphylium vesicarium*			
Pimiento	Oidium	*Leveilula taurica*			
Alcachofa	Oidium	*Leveilula taurica*	1.0-1.5		
Arándano*	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	2		
	Microsphaera	*Microsphaera penicillata*	0.4		
Palto	Podredumbre gris	*Botrytis cinerea*	2		

U.A.C: Ultima aplicación antes de la cosecha en días LMR: Límites máximos de residuos N.A: no aplica.
* Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Se recomienda de 3 a 4 aplicaciones por campaña. Considerando 1 campaña al año para los cultivos de vid, espárrago, alcachofa, arándano y palto; y 2 campañas al año para el cultivo de pimiento.
En el cultivo de arándano para el control de podredumbre gris se recomienda aplicar desde el desarrollo de la floración hasta la maduración de bayas, repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días. Para el control de oídium se recomienda aplicar desde el desarrollo vegetativo hasta la floración, con intervalos de 9 días.

PERIODO DE REINGRESO
Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD
No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomicina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos podrían ocasionar fitotoxidiad en el cultivo.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PRECAUCIÓN

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA