

Nueva dirección de Huachipa

Etiqueta **PROBAC x 10L** 28.7cm x 15cm COEX 28.04.22

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

- Nota al médico:

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg

DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación en ríos, rios u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para estos fines.

PROBAC BS®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Bacillus subtilis, Cepa ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1×10^{12} unidades formadoras de colonia (UFC)..... 92%
Aditivos 9%

Reg. PBUA N° 136 - SENASA

Titular de Registro, Formulado, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principes 2, Lote C5 (Lote 3B, 4 y 5)

Z.I. Huachipa Este

San Antonio - Huancuchirí, Lima

Centro: (01) 614 1500

FARMAGRO 

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 10L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROBAC BS (*Bacillus subtilis* Cepa ULTRAQ-07) es un producto de contacto, tiene efectos antagonísticos hacia patógenos de los cultivos que se indican en el cuadro de usos. Por efecto de exclusión competitiva de nutrientes y espacio.

Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acorcione la piel del agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que a la hora de gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de bio-estick adicionado 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección contra degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/Cil	P.C. (Días)	L.M.R. (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico			
Vitis	Oidium	Uncinula necator	1.5 - 2	N.A.	N.A.
Esparrago	Mancha purpura	Stemphylium vesicarium			
Prunio	Oidium	Leveillula taurica			
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1.0 - 1.5		
Arándano*	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		

P.C.: Periodo de carencia

LMR: Límites máximos de residuos

N.A.: no aplica.

* Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.

Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



Nueva dirección de Huachipa

Etiqueta **PROBAC x 5L** 28.7cm x 15cm COEX 28.04.22

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

- Nota al médico:

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg

DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación en ríos, lagos, ríos u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para estos fines.

PROBAC BS

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Bacillus subtilis, Cepa ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1×10^{12} unidades formadoras de colonia (UFC)..... 92%
Aditivos 9%

Reg. PBUA N° 136 - SENASA

Titular de Registro, Formulado, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principes 2, Lote C5 (Lote 3B, 4 y 5)

Z.I. Huachipa Este

San Antonio - Huancuchirí, Lima

Centro: (01) 614 1500

FARMAGRO
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 5L

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROBAC BS (*Bacillus subtilis* Cepa ULTRAQ-07) es un producto de contacto, tiene efectos antagonistas hacia patógenos de los cultivos que se indican en el cuadro de usos. Por efecto de exclusión competitiva de nutrientes y espacio.

Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acomódese a la altura del agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de bio-estick adicionando 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección contra degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS L/Cil	P.C. (Días)	L.M.R. (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico			
Vitis	Oidium	Uncinula necator	1.5 - 2	N.A.	N.A.
Esparrago	Mancha purpura	Stemphylium vesicarium			
Prunero	Oidium	Leveillula taurica			
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1.0 - 1.5		
Arándano*	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		

P.C.: Periodo de carencia

LMR: Límites máximos de residuos

N.A.: no aplica.

* Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.

Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



Etiqueta **PROBAC** x 1L 28.7cm x 15cm COEX 28.04.22

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrole la etiqueta.

- Nota al médico:

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg
DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500
CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente,
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación con ríos, ríos u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROBAC BS[®]

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN :

Bacillus subtilis, Ceba ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1×10^{12} unidades formadoras de colonia (UFC)..... 2%

Aditivos..... 98%

Reg. PBUA N° 136 SENASA

Titular de Registro, Formulador, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2, Of. C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachina Est.
San Antonio - Huachinirí, Lima
Central: (01) 514 1500


FARMAGRO S/A

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto:1L
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN



Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el producto en el agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que se aplique gota en gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de 510-Stic® adicionado de 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección a la degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre científico	DOSIS L/cil	P.C. (Días)	L.M.P. (p.p.m)
Vino	Oidium	Uncinula necator	1.5 - 2	N.A.
Esparrago	Mancha púrpura	Stemphylium vesicarium		
Problema	Oidium	Leveillula taurica		
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1.0 - 1.5	
Arándano*	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2	
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2	

P.C.: Período de carencia LMR: Límites máximos de residuos N.A: no aplica.
* Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga. Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomicina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



Nueva dirección de Huachipa

Etiqueta **PROBAC x 500ml** 22.8 cm x 12cm COEX 28.04.22

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

- Nota al médico:

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg

DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500

CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas, organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación en ríos, lagos, norias u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para su disposición.

PROBAC BS®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN :

Bacillus subtilis, Cepa ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1×10^{12} unidades formadoras de colonia (UFC)..... 98.6 %
Aditivos 1.4 %

Reg. PBUA N° 176 SENASA

Titular de Registro, Formulador, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Principal N° 1235 (Lote 3B, 4 y 5)

Z.I. Huachipa Este

San Antonio - Huarochiri, Lima

Central (01) 614 1500

FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 500ml

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROBAC BS (*Bacillus subtilis* Cepa ULTRAQ-07) es un producto de contacto, tiene efectos antagónicos hacia patógenos de los cultivos que se indican en el cuadro de usos. Por efecto de exclusión competitiva de nutrientes y espacio.

Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para conseguir una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de boquilla atomizadora 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección a la degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Nombre común	Nombre científico	DOSIS L/Cil	P.C. (Días)	L.M.R. (p.p.m)
Vicia	Oidium	Uncinula necator	1.5 - 2	N.A.	N.A.
Espartero	Botrytis purpurea	Stemphylium vesicarium			
Arroz	Oidium	Leveillula taurica			
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	1.0 - 1.5		
Arándano*	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		

P.C.: Periodo de carencia

* Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

LMR: Límites máximos de residuos

N.A.: no aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.

Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



Etiqueta **PROBAC x 250ml** 20.5x7cm COEX Nueva dirección

28.04.22

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
• No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica, muéstrele la etiqueta y hoja informativa.

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces con agua y vierta la solución en la mezcla o aplicación, luego utilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o desposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realice oportunamente el triple lavado del presente envase.

PROBAC BS®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
Bacillus subtilis, Cepa ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1 x 10¹⁰ unidades formadoras de colonia (UFC) 92%
Aditivos 98%

Reg. PBI/A N° 166 - SENASA

Título de Registro, Formulador, Importador y Distribuidor:
FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2, Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)
Z.I. Huachipa Este
San Antonio - Huarochiri, Lima
Central: (01) 614 1500

FARMAGRO 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que se adecúan para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 250ml
Fecha de vencimiento:



LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

PROBAC BS®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORMULACIÓN: Suspensión concentrada (SC)

N° DE REGISTRO: PBUA N° 186- SENASA

NOMBRE:

Bacillus subtilis, Cepa ULTRAQ-07

FÓRMULA ESTRUCTURAL

No aplica

FÓRMULA EMPÍRICA:

No aplica

PESO MOLECULAR:

No aplica

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL FORMULADO:

Aspecto: Líquido

Color: Té

Olor: característico

Densidad: 1.0025 g/ml

pH: 5.7

COMPOSICIÓN:

Bacillus subtilis, Cepa ULTRAQ – 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de 1×10^{12} unidades formadoras de colonia (UFC)2 %

CAPACIDAD Y CLASE DE LOS ENVASES:

Tipo: Cilindro, bidón y frasco

Material: COEX, PEAD y PET (Polietileno de alta densidad)

Capacidad: Cilindro PEAD x 200 L; bidón PEAD X 10 L, frasco COEX x 250 ml, 500 ml y 1L; Frasco PET x 1 L.

Titular de Registro, Formulador, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A

Av. Principal 2. Mz C5 (Lote 3B, 4 y 5)

Z.I. Huachipa Este

San Antonio - Huarochirí, Lima

Central: (01) 614 1500

FARMAGRO S.A

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

FARMAGRO S.A

MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

**LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN**

dirección actualizada

PROBAC hoja informativa 16.5 x 19.5

28.04.22

LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrela la etiqueta.

- Nota al médico:

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg

DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adoptar medidas sintomáticas.

Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106 / FARMAGRO: (051-1) 614 1500

CISPROQUIM: 080 050 847

CONDICIONES DE ANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROBAC BS (*Bacillus subtilis* Cepa ULTRAQ-07) es un producto de contacto, tiene efectos antagónicos hacia patógenos de los cultivos que se indican en el cuadro de usos. Por efecto de exclusión competitiva de nutrientes y espacio. Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el pH del agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto directamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto luna" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de BIO-stick adicionando 250 ml/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección a la degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Cil	P.C. (Días)	L.M.R (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico			
Vid	Oñura	<i>Uncinula necator</i>	1.5-2	N.A.	N.A.
Esparrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>			
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1.0-1.5		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>			
Arándano*	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2		
Maíz	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2		

P.C.: Período de carencia

LMR: Límites máximos de residuos

N.A.: no aplica.

*Gota máxima de agua 625 L / Ha.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga. Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

COMPATIBILIDAD

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomycin, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

