Etiqueta PROBAC x 20L 28.7cm x 15cm COEX 28.04.22

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL **ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- •No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- •Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua v iabón.
- •Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- •No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. •No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad. •Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica v muéstrele la etiqueta.
- Nota al médico:

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500 CISPROQUIM: 080-050-847

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuaque tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entreque o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente en

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENT

- -El producto es biodegradable, no es un conteminante del ambiente, -El producto no es tóxico a peces, avez, abe as y organismos acuáticos. -No lavar los envases ni equipo de apreació con la gos, ríos u otras fuentes de agua. -En caso de derrame, recor er el produt o y lepositarlo en sitios destinados por las autoridades locales par

PROBAC BS

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Bacillus subtilis. Cepa ULTRAQ - 07: Contiene por cada de producto, no menos de 1 x 10¹² unidades formado Aditivos

Reg. PBUA Nº 186 SENA

Titular de Registro, Formulado v Distribuidor: FARMAGRO S.A

z C5 (L te 3B, 4 y 5)

Antonio - i uarocnirí, Lima

4 1500



Fecha de Formulación: N° de Lote Contenido neto: 20L Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PROBAC BS (Bacillus subtilis Cepa ULTRAQ-07) es un producto de contacto, tiene efectos antagónicos hacia patógenos de los cultivos que se indican en el cuadro de usos. Por efecto de exclusión competitiva de nutrientes y espacio.

Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acor del agua en el rango de 5 a 8. Vierta la cantidad necesaria del producto di ctamente con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre la hoias. A rra tra mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de olo-stic adiciona do 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia como la degradación por rayos solares. Realizar la aplicación signiendo la direcció del viento.

N UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLA		DOSIS	P.C.	L.M.R
	Nombi co nú	Nombre científico	L/Cil	(Días)	(p.p.m)
Vi	idium	Uncinula necator			
Esparrag	Muncha purpura	Stemphylium vesicarium	1.5 - 2		
Puniento	Oidium	Leveilula taurica		N.A.	N.A.
Alcachofa	Oidium	Leveilula taurica	1.0 - 1.5	IN.A.	N.A.
Arándano*	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		
Palto	Podredumbre gris	Botrytis cinerea	2		

P.C.: Periodo de carencia * Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

LMR: Límites máximos de residuos

N.A: no aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

PROBAC BS puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga.

Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomicina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

La aplicacón de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



















LIGERAMENTE TÓXICO **PRECAUCIÓN**



















