

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacene a temperaturas superiores a 35 °C. Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración sin llegar a congelarlo para mantener su viabilidad.
- Guarde el producto en un lugar, fresco, seguro y bajo llave.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con la piel y ojos, lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos. Consiga atención médica y muéstrele la etiqueta.

- Nota al médico:

DL50 Oral Aguda > 2000 mg/kg  
DL50 Dermal Aguda > 2000 mg/kg

Antídoto: No requiere de antídoto ni tratamiento específico, adopte medidas sintomáticas.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
**SAMU: 106 / FARMAGRO: (01) 614 1500**  
**CISPROQUIM: 080-050-847**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- El producto es biodegradable, no es un contaminante del ambiente.
- El producto no es tóxico a peces, aves, abejas y organismos acuáticos.
- No lavar los envases ni equipo de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# PROBAC BS®

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN :**

*Bacillus subtilis*, Cepa ULTRAQ - 07: Contiene por cada litro de producto, no menos de  $1 \times 10^{12}$  unidades formadoras de colonia (UFC)..... 92%  
Aditivos ..... 9%

**Reg. PBUA N° 136 - SENASA**

Titular de Registro, Formulado, Importador y Distribuidor:

**FARMAGRO S.A.**  
Av. Principal 2, Lote C5 (Lote 3B, 4 y 5)  
Z.I. Huachipa Este  
San Antonio - Huacho, Lima  
Central: (01) 614 1500

**FARMAGRO**  
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Fecha de Formulación:  
N° de Lote:  
Contenido neto: 200L  
Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PROBAC BS** (*Bacillus subtilis* Cepa ULTRAQ-07) es un producto de contacto, tiene efectos antagonicos hacia patógenos de los cultivos que se indican en el cuadro de usos. Por efecto de exclusión competitiva de nutrientes y espacio.

Para su adecuada aplicación, agite el producto antes de usarlo. Acondicione el producto con la suficiente cantidad de agua, manteniendo agitación constante para asegurar una mezcla homogénea. Dada su formulación exige que el tamaño de gota en la aplicación sea fino para evitar "efecto lupa" sobre las hojas. Para una mayor calidad de la aplicación es recomendable el uso de bio-estímulos adicionado 250 mL/100 L de agua para proveer humectación, adherencia y protección contra degradación por rayos solares. Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Cil	P.C. (Días)	L.M.R (p.p.m)
	Nombre común	Nombre científico			
Vitis	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	1.5 - 2	N.A.	N.A.
Esparrago	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>			
Prunier	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>			
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	1.0 - 1.5		
Arándano*	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2		
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	2		

P.C.: Periodo de carencia LMR: Límites máximos de residuos N.A.: no aplica.  
\* Gasto máximo de agua 625 L / Ha.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**PROBAC BS** puede aplicarse al inicio de la enfermedad ó cuando se presenten condiciones favorables para el desarrollo de la plaga. Para el cultivo de arándano se recomienda desde desarrollo floración a maduración de bayas, cuando se observan los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones con intervalos de 6 días.

**PERIODO DE REINGRESO**

Reingresar al área tratada una vez que el producto aplicado este seco.

**COMPATIBILIDAD**

No deberá mezclarse con bactericidas (oxitetraciclina, estreptomocina, gentamicina), productos cúpricos, alcalinos o que alteren el rango de pH de la mezcla. Evite el uso de coadyuvantes iónicos.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrán ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

ETIQUETA PARA USO EXCLUSIVO DEL SENASA



**LIGERAMENTE TÓXICO  
PRECAUCIÓN**

