

18.00 centímetros

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Rice - King®

360 WP®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE- WP

COMPOSICIÓN

Bensulfuron methyl.....30 g/kg
Quinclorac330 g/kg
Aditivos c.s.p. 1kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (aspersión).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Sulfonilurea + Quinolincarboxylic acid
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapato contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado.
- Brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Tratamiento médico: Aplique tratamiento sintomático.
- Antídoto: Sin antídoto específico.
- Teléfonos de emergencia: Infosalud: 0800-10-828, CISPROOUIIM: 080-050-847.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi acuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RICE-KING 360 WP, es un herbicida de contacto selectivo al arroz y que se emplea en post-emergencia del cultivo y las malezas; controla gramíneas, ciperáceas y malezas de hoja ancha en emergencia post-temprana.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Llene el tanque con agua hasta un tercio del agua a utilizar, añada la dosis recomendada de RICE-KING 360 WP, agite hasta lograr una mezcla homogénea, finalmente complete con la cantidad de agua necesaria.

Continúe agitando hasta antes de iniciar la aplicación.

Aplicar con cualquier equipo de aspersión, tratando de lograr una cobertura uniforme.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	PLAGA		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/ha	g/cil		
Arroz	Moco de pavo	Echinochloa cruz-galli	1.0	-	98	*0.02 **5.0
	Yuyo	Amaranthus spinosus				
	Coquito	Cyperus rotundus				
	Caminadora o arracillo	Rottboellia cochinchinensis				

P.C. = Período de carencia en días. L.M.R = Límite máximo de residuos en partes por millón *Bensulfuron methyl **Quinclorac

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Se recomienda una aplicación por campaña al año. Aplicar después del trasplante (15 a 20 días) cuando el cultivo está en inicio de macollamiento.

PERÍODO DE REINGRESO: No entrar a las áreas tratadas durante las primeras 72 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: RICE-KING 360 WP es compatible con plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes fuertes,

FITOTOXICIDAD: RICE-KING 360 WP no es fitotóxico a los cultivos indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

22.00 centímetros

Titular de Registro :FARMEX S.A.
Formulado, Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148. Piso 7.
San Isidro, Lima-Perú
Teléfono: 630-6400

Reg. PQUA N°..... - SENASA

CONTENIDO NETO:
1 Kilogramo

Lote N°:
F. Fab.:
F. Venc.:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

