

STROBISEN 250 SC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Azoxystrobin..... 125 g/L.
Flutriafol..... 125 g/L.
Aditivos..... c.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° XXX-SENASA

Grupo Químico: Estrobilurina; Triazol.

Nombre Químico:


Azoxystrobin: methyl (E) -2-[6-(2-cyanophenoxy) pyridin-4-yloxy] phenyl)-3-methoxyacrylate.
Flutriafol: (RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) benzhydryl alcohol

Formula Empírica:

Azoxystrobin: C₂₂H₁₇N₃O₅
Flutriafol: C₁₆H₁₃F₂N₃O

Formula Estructural:

Azoxystrobin:




NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

Flutriafol:



PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Blaquesucino
Olor: Debil aromatico
pH: 5.6
Inflamabilidad: Punto de inflamación: >93 °C
Propiedades explosivas: No explosivo

Fecha de formulación: Ver etiqueta

N° de lote: Ver etiqueta

Contenido neto : Ver etiqueta

Fecha de Vencimiento: Ver etiqueta

TITULAR DE REGISTRO: JEBSEN & JESSEN PERÚ S.A.C

Av. de la Floresta 497, Oficina 201. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima 41. Lima – Perú

FORMULADO POR: NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.

Tel: 86 25 86518999 ext. 836

Fax: +86 25 86455985

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: JEBSEN & JESSEN PERÚ S.A.C

Av. de la Floresta 497, Oficina 201. Chacarilla del Estanque, San Borja, Lima 41. Lima – Perú

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Estrobilurina; Triazol.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente o padece convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado. Bañarse con abundante agua y jabón.

- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.

Teléfonos de Emergencia:

• CICOTOX: 0800-13040

• ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido enjuague tres veces envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilizelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos, días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos de 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En casos de derrame, el producto debe ser recogido inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



LEA LA ETIQUETA Y ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado. No ingerir.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, la ve la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

STROBISEN 250 SC, con ingredientes activos Azoxystrobin y Flutriafol pertenecen a la familia química de las estrobilurinas y triazoles, respectivamente.

STROBISEN 250 SC, tiene acción sistémica, translaminar y contacto. Aplicar STROBISEN 250 SC, cuando se prevean lluvias de tal manera que no se produzca lavado de producto y se de un tiempo seco suficiente para que el productos se adhiera a la planta y pueda generar controles satisfactorios.

VARIETADES SUSCEPTIBLES: No se han observado efectos aplicando en la dosis y forma recomendadas.

MÉTODO DE APLICACIÓN: La aplicación se lo puede realizar por aspersión a nivel de toda la planta cubriendo todo el follaje de tal modo que exista un contacto total con el fungicida.

EQUIPO DE APLICACIÓN Y SU CALIBRACIÓN: STROBISEN 250 SC puede ser aplicado con mochila de pulverizadora a motor con capacidad de 20 litros, una descarga de 1,5 litros/ minuto y una presión de 15 – 25 kg/cm²; utilizando una boquilla cono hueco.

PERÍODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: STROBISEN 250 SC, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cultivo	Nombre de Enfermedad		Dosis (mL/200L)	P.C (días)	LMR
	Nombre Común	Nombre Técnico			
ARROZ	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	400	28	5* 1,5**
VID	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	14	2* 0,8**
TOMATE	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	400	7	0,2* 0,3**

PC = Período de carencia
* Azoxystrobin

LMR = Límite mínimo residual
**Flutriafol



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

