54.8 cm

13.1 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
-Posible carcinogénico para humanos.
-Este producto es de cuidado, no ingerir.
-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
-Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
-Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas
-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
-No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
-Grupo químico: Phosphonoglycine
-En caso de inhalación: mover a la persona al aire libre, brindar respiración artificial, si es necesario. Llamar al médico.
-En caso de ingestión: No inducir al vómito. No administrar nada por la boca a una persona inconsciente.
-En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón, retirando la ropa y zapatos contaminados.
-No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
-**NOTA AL MÉDICO:** El tratamiento será sintomático. No existe ANTÍDOTO específico.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: samu: 106 / TOC S.A.: (01) 6126565

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
-Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
-No aplicar el producto cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
-El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
-En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

TRIPLE LAVADO
ECONOMIA AMBIENTE

® Marca Registrada

GLIFOKLIN®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO SOLUBLE- SL

COMPOSICIÓN:
Glyphosate (En forma de Sal Isopropilamina) ..... 480 g/L
Aditivos ..... csp 1L

(*) Equivalente a 360 g/L de Gliphosate

Reg. PQUA N° 2408 - SENASA

Titular del Registro:
TOC
Tecnología Química y Comercio S.A.
Calle René Descartes N. 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Tel.: 612-6565
R.U.C N°. 20307150981

Importado y Distribuido por:
Talex
TALEX PERU S.A.C.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Tel.: 612-6565
R.U.C. N° 20513013826

Formulado por:
Ningbo Generic Chemical Co., Ltd.
Room 10-6, Shidai Square, N° 8, Lengjing
3005 NanhuRd., Luohu District,Shenzhen, China.
Street, Ningbo 315010, Zhejiang, China.

Contenido Neto:			10 L			

Lote N° :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: GLIFOKLIN es un herbicida sistémico, no selectivo; empleado para el control post-emergente de las malezas gramíneas, ciperáceas y de hoja ancha, anuales y perennes. **GLIFOKLIN** se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un coadyuvante acidificante a la mezcla para favorecer la dispersión, adherencia y eficacia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión terrestre, provista de boquillas de abanico. Evitar la deriva o arrastre de la solución a cultivos vecinos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO".

CULTIVO	MALEZA						
	Nombre comun	Nombre cientifico	Malezas anuales		Malezas perennes	PC (filea)	LMR (ppm)
			L/ha	L/200L	L/ha	L/200L	
CAÑA DE AZÚCAR	Coquillo	*Cyperus esculentus*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	56	2
	Coquillo	*Cyperus rotundus*						
CÍTRICOS	Setaria	*Setaria geniculata*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	7	0,2
	Setaria dulce	*Setaria verticillata*						
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*						
MANZANA	Setaria	*Setaria geniculata*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	7	0,2
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*						
	Grama salina	*Urochloa mutica*						
VID	Setaria	*Setaria geniculata*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	14	0,2
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*						
	Grama salina	*Urochloa mutica*						
MELOCOTÓN	Setaria	*Setaria geniculata*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	7	0,2
	Grama dulce	*Cynodon dactylon*						
	Grama salina	*Urochloa mutica*						
CAFÉ	Pata de gallina	*Eleusine indica*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	28	0,1
	Cadillo	*Urochloa extensatus*						
	Cola de zorro	*Setaria lutea*						
	Cola de gallina	*Setaria adhaerens*						
PALMA ACEITERA	Cadillo	*Urochloa extensatus*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	7	0,1
	Cola de zorro	*Setaria lutea*						
TÉ	Pata de gallina	*Eleusine indica*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	7	1,0
	Cadillo	*Urochloa extensatus*						
	Cola de zorro	*Setaria lutea*						
PASTIZALES CULTIVADAS, CANALES, ACEQUIAS, DRENES, Y BORDES, ZONAS INDUSTRIALES, CAMINOS, DESPOSITOS	Grama china	*Sorghum halepense*	2-3	1-1.5	4-5	2-2.5	NA	NA
	Bahia de asnin	*Setaria sp.*						
	Verdolaga	*Portulaca oleracea*						
	Yaqo	*Amaranthus retroflexus*						

P.C.= Periodo de carencia, no aplica por ser un producto dirigido a la maleza / L.M.R= Limite máximo de residuos / N.A. = No aplica / (*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 200-400 L/ha dependiendo de la densidad de las malezas.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Una sola aplicación por campaña en post-emergencia temprana. En malezas anuales de hoja ancha y gramíneas aplicar en los estados tempranos de crecimiento. En las malezas perennes de sistema radicular profundo aplicar al inicio de la floración. También, aplicar sobre las malezas dentro y a lo largo de los canales de irrigación, drenes, bordes, acequias y calles.
PERIODO DE REINGRESO: 12 horas.
COMPATIBILIDAD: GLIFOKLIN no debe mezclase con herbicidas post-emergentes de contacto, ni con herbicidas hormonales.
FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.
RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto. "

V1 2.2 05/2020

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

PANTONE 293 C PANTONE 362 C NEGRO

1 cm

ETIQUETA PARA EL USO EXCLUSIVO DEL SENASA