S

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- -- Grupo químico: Diphenyloxazoline No existe antídoto específico. Tratamiento sintomatíco.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

ESSALUD: 0-801-10200

CICOTOX: 0800-13040

CROP BUSINESS SAC: 349-2669

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

ACARICIDA-INSECTICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN:

Ftoxazole 112 g/L Aditivos c.s.p. 1 L

Reg. PQUA N° Titular del Registro: CROP BUSINESS S.A.C.

Importado y distribuido por: CROP BUSINESS S.A.C.



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación: Nº de Lote: Contenido Neto: 250 ml Fecha de Vencimiento:

Formulado por: NANJING RHONQUIM CO., LTD N° 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu, 210009

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ETOXACROP 112 SC es un acaricida - insecticida no sistémico, actúa por contacto e ingestión, utilizado en el control de ácaros fitopatógenos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	(dias)	(ppm)
Vid	Arañita roja	Tetranychus urticae	0.06	14	0.5
Palto	Plaga del espárrago	Oxydia vesulia	0.06	15	0.01

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límites máximos de residuos (ppm: partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Iniciar el tratamiento previa evaluación del cultivo, cuando la presencia de la plaga en el cultivo sea de al menos 5% de incidencia. Se recomienda realizar como máximo hasta 4 aplicaciones por campaña considerando una campaña por año para los cultivos de palto y vid, con intervalo entre aplicaciones de 7-14 días. RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas























