

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

BEKRON

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate	100 g/kg
Lufenuron	400 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 2372 - SENASA

Titular de Registro: FSR CONSULTORES E.I.R.L
 Jirón Luis N. Sáenz 348 Int. 101 - Jesús María - Lima
 Teléfono: 920534766

Formulador:



Beijing YOLOO Bio-Technology Corp., Ltd.
 Add: Derenwu Village, Yongliedian Town,
 Tongzhou District, Beijing, CHINA.
 Tel. 86-10-33933269.
 Fax. 86-10-8936021381363677

Importador y Distribuidor:



Calle Sucre 270 Ate. Lima, Perú.
 Telf.: 717-9040 / 717-9041
 R.U.C. 20101637221
 RU N° 141097

Fecha de Formulación:
 N° de Lote:
 Contenido neto: 50 g.
 Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primas 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta y hoja informativa adjunta".

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106

Teléf. del titular: 920534766

Consulte con un ingeniero agrónomo

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/Ha	kg/200L		
Espárrago (<i>Asparagus officinalis</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.075	-	14	*0.01 **0.02
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.08	-	7	*0.02 **0.8
Maíz (<i>Zea mayz</i>)	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	-	0.050 - 0.075	14	*0.01 **0.01

P.C. Periodo de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

* Emamectin benzoate ** Lufenuron

Gasto máximo de agua para el cultivo de maíz es 375 L.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda aplica **BEKRON** hasta 2 aplicaciones por campaña / 2 campañas por año y una frecuencia entre aplicaciones de 14 a 21 días para los cultivos de espárrago y pimiento. Y para el cultivo de maíz aplicar 1 vez por campaña / 1 campaña al año.

