

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos y ventilados.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 12 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Pyrethroid y Neonicotinoid
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no inducir vómitos sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece de convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia por al menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados. Bañarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y zapatos contaminados y lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un lugar ventilado, brindar respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
SAMU: 106
AGROINTESA PERÚ S.A.C.: (01) 620-5058

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado
- Realizar obligatoriamente el triple lavado, del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficiosos. No aplicar en época de floración del cultivo.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrenantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



HERLAM

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:
 Imidacloprid.....100 g/L
 Bifenthrin.....30 g/L
 Aditivos.....c.s.p 1L

Reg. PQUA Nº 2414-SENASA

Titular del Registro: **SAL BIOSCIENCIAS PERÚ S.A.C.**
 Av. Canaval y Moreyra 542. San Isidro, Lima - Perú



Formulador: **SINO-AGRI LEADING BIOSCIENCIAS CO., LTD.**
 Building C, Global Finance & News Center, No.
 A1, Xuanwumenwai Street, Beijing, China 100052
 Teléfono: +86-10-59337480

Importador, Distribuidor: **AGROINTESA PERÚ S.A.C.**
 Av. Mariscal José de la Mar, Urb. Santa Cruz 1120
 (Oficina 606), Miraflores, Lima - Perú, Tel.: 5116205058
 Email: info@agrointesa.com.pe www.agrointesa.com.pe



CONTENIDO NETO: 4 L
Número de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
HERLAM es un insecticida sistémico de largo poder residual, actúa por contacto e ingestión en el insecto.

HERLAM puede ser aplicado usando una mochila manual, previa calibración del equipo para conocer el gasto de agua por hectárea.
 El producto debe aplicarse previa evaluación en campo. Diluir en una cantidad parcial de agua, luego añadir más agua hasta completar el volumen final.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L/Ha	RC (días)	L.M.R (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Mandarina	"Minador de cítricos"	Phyllocnistis citrella	0.3	21	0.05* 1.0**

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)

*Bifenthrin

**Imidacloprid

PC: Período de Carencia.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
 Se recomienda realizar 1 aplicación/campaña/año y en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo

PERIODO DE REINGRESO
 No entre a las áreas tratadas hasta después de 12 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD
HERLAM no se debe mezclar con químicos altamente reactivos como ácidos o bases fuertes o agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD
 La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL
 El titular del registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si se requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**

