

PRECAUCIONES, MANIPULEO Y ALMACENAJE

TRICONOVA no es tóxico para el ser humano ni para los animales, sin embargo se debe tener cuidado en el uso y seguir las siguientes precauciones:

- Usar guantes, máscaras, botas de jebe y mamelucos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y ropa.
- No comer, fumar, ni beber durante la preparación o aplicación del producto
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, medicinales ni forrajes.
- Almacenar el producto bajo refrigeración a temperaturas de 5 - 8 °C. para prolongar la viabilidad hasta 4 meses.
- Una vez abierto aplicar inmediatamente.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación lleve al paciente al médico.

DL₅₀ oral aguda: 2000 - 5000 mg/Kg. de peso

DL₅₀ dermal aguda: > 4,000 mg/Kg. de peso

NOTA AL COMPRADOR

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

"MANTÉNGASE ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES"



TRICONOVA

(*Trichoderma harzianum*)

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ingrediente Activo: *Trichoderma harzianum* 4 x 10¹² esporas viables..... /L
Ingredientes emulgentes e inertesc.s.p. 1 L

FUNGICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRÍCOLA

Reg. PBUA N° 0307 - SENASA

Titular del Registro: Novagri S.A.C.
Av. Los Fundadores S/N
Santa Rita de Sigüas - Arequipa.
Fabricado, formulado y distribuido por:
Novagri S.A.C. - RUC: 20454845057
Arequipa - Perú
Cel. 959013417



N° de Lote:

Contenido Neto: 30 ml

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

INDICACIONES DE USO

Es efectivo para el control de *Fusarium*. Útil para el control de *Botrytis* en floración de palto y mandarina. Es además un promotor de crecimiento radicular.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Diluir el volumen del formulado requerido en un pequeño volumen de agua corregida (dureza menor a 150 ppm de carbonatos y pH de 5.0 - 7.0).

Remojar 24 horas antes de la aplicación.

Completar con el volumen de agua necesario para la aplicación, este segundo volumen no requiere corrección.

CUADRO DE DOSIFICACIÓN

Cultivo	Nombre de la plaga		Tipo de aplicación	Dosis L/ha.	U.A.C. (días)	L.M.R. (p.p.m)
	Común	Científico				
Quinua	Chupadera	<i>Fusarium oxysporum</i>	Radicular	0.50	n.r.	n.r.
Cebolla	Chupadera Podredumbre Blanda			0.75	n.r.	n.r.
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	Foliar	0.50	n.r.	n.r.
Cítricos				0.50	n.r.	n.r.

* No se requiere (n.r.) U.A.C. (última aplicación a la cosecha) ni L.M.R. (límite máximo de residuos) por tratarse de productos biológicos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

La época y frecuencia de aplicación es condicional a la aparición de la plaga, al ser un producto biológico tiene un uso preventivo. Seguir las instrucciones y recomendaciones de su asesor técnico

COMPATIBILIDAD

Es compatible con herbicidas, fertilizantes de reacción ácida y productos biológicos formulados en base de hongos o bacterias. No use fungicidas mientras el hongo este en su mayor capacidad (un mes aprox.). La aplicación de TRICONOVA a nivel radicular no impide el uso de fungicidas químicos a nivel foliar.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis recomendada.

PRECAUCIÓN

"DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO"

