0.20

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO" MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONESY ADVERTENCIAS DE USOY APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Presenta ligera irritación al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- · Conservar este producto en su envase original, bien tapado, etiquetado y alejado de alimentos para consumo humano o animal.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo químico: triazoles.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- · En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- · En caso de inhalación, trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y proporcionar ayuda respiratoria si fuera necesario. Consultar al médico.
- En caso de ingestión, colocar al paciente en posición tranquila. No inducir al vómito, especialmente si el paciente está inconsciente. Llevar al paciente al
- Teléfono de Emergencia: CISPROQUIM: 080-050-847, FARMEX S.A.: (01) 630-6400.
- · Antídoto: no hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios. destinados por las autoridades locales para este propósito.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- · Peligroso para organismos acuáticos.
- · No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases
- · No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5
- · Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestres. No permitir
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- . En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN, ACEITE EN AGUA (EW)

MPOSICIÓN:	

Reg. PQUA Nº 861 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por: JIANGSU FLAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. Changfenghe Road, Nanjing Chemical Industrial Park, Luhe, Nanjing, China.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7 San Isidro, Lima 27 - PERU Teléfono: (511) 630-6400 Fax: (511) 630-6410 www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 20 L

Lote Nº : F. Form. :

F Venc :

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

@marca registrada por FARMEX S.A.

INSTRUCCIONES DE USOY MANEJO

PERSEO® es un fungicida sistémico con acción protectora y curativa que se absorbe rápidamente a través de las hojas y actúa inhibiendo la biosíntesis del

PERSEO® se absorbe rápidamente a través de las hojas y actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol del hongo.

PERSEO® se aplica en pulverización empleando equipos de aspersión manuales, a motor o montados sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente. Complete luego hasta el volumen deseado.

"CONSULTE CON UN INCENIEDO ACDÓNOMO"

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO								
CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.		
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	mL/200L	L/ha	(días)	(ppm)		
Capsicum annumm (pimiento, páprika, piquillo)	Oidiosis	Leveilulla taurica	200 - 250	0.5 - 0.625	7	1		
Espárrago Cercosporiosis Mancha púrpura	Cercosporiosis	Cercospora asparagi	200 - 400	0.5 - 0.6				
	Stemphylium vesicarium	200	0.5	40	0.05			
Vid	Oidiosis	Erysiphe necator	100 - 500	0.4 - 0.6	7	6		

L.M.R.: Límite máximo de residuos. P.C.: Período de carencia (días).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

No realizar más de 2 aplicaciones por campaña/año. El intervalo de aplicación es de 15 días

PERÍODO DE REINGRESO

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los plaguicidas comúnmente usados a excepción de los de reacción alcalina. Antes de hacer la mezcla con otros plaquicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD

PERSEO® no ha mostrado síntomas de fitotoxicidad luego de ser aplicado en los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto 5 contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es 5 eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO **CUIDADO**



0.50 cm