

Medidas: 19 cm x 4.5 cm
ABRIL 2019
AG

PANTONE YELLOW C

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MONTANA



ENVIGO
PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
ACARICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Hexythiazox.....250 g/L
Fenpyroximate.....200 g/L
Aditivos.....csp 1 L

Reg. PQUA N° XXX – SENASA / TITULAR DE REGISTRO: MONTANA S.A.

Formulado y Distribuido por: MONTANA S.A.

Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401, La Molina. Lima - Perú. / Teléfono: (511) 4193000

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

•ENVIGO es un acaricida de contacto e ingestión que presenta un movimiento translaminar en la hoja y buena persistencia en la cutícula foliar. Actúa inhibiendo la síntesis de quitina (efecto del hexythiazox) y afecta la respiración del ácaro a nivel del complejo mitocondrial I (efecto del fenpyroximate), de esta manera ENVIGO no presenta resistencia cruzada entre sus componentes. Después de la aplicación el ácaro reduce el ritmo de alimentación y controla todos los estadios de desarrollo tales como: huevos, larvas, ninfas y adultos; así mismo afecta la fecundidad de las hembras disminuyendo la producción de huevos.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Ácaro	<i>Olygonichus punicae</i>	0.04- 0.06	7	0.2 (1) 0.5 (2)

PC: Período de Carenia / LMR: Límite Máximo de Residuos. (1) Fenpyroximate (2) Hexythiazox

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Contenido Neto: 100 ml

Lote N°:
Fecha de Form.:
Fecha de Venc.:

