

Medidas etiqueta 200ml: 19.3 cm x 7.3 cm  
ABRIL 2022  
AG

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS  
NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar la aspersión.
- Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**Contenido Neto: 200 ml**

Nº de Lote:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

**ENVIGO®**

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**ACARICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Hexythiazox.....250 g/L  
Fenpyroximate.....200 g/L  
Aditivos.....csp 1L

Reg. PQUA N° 2428 – SENASA

**Titular de Registro:**  
**MONTANA S.A.**

**Formulado y distribuido por:**  
**MONTANA S.A.**  
Av. Javier Prado Este N° 6210, Ofi. 401,  
La Molina, Lima -Perú. / Telf: (511) 4193000  
E-mail: info@corpmontana.com

**MONTANA**

**NO CORROSIVO    NO INFLAMABLE    NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

• **ENVIGO** es un acaricida de contacto e ingestión que presenta un movimiento translaminar en la hoja y buena persistencia en la cutícula foliar. Actúa inhibiendo la síntesis de quitina (efecto del hexythiazox) y afecta la respiración del ácaro a nivel del complejo mitocondrial I (efecto del fenpyroximate), de esta manera ENVIGO no presenta resistencia cruzada entre sus componentes.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Palto	Ácaro	<i>Olygonychus punicae</i>	0,04- 0,06	30	0,2 (1) 0,5 (2)
Mandarino	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0,04- 0,06	14	0,5 (1) 0,5 (2)
Vid	Arañita roja	<i>Tetranychus urticae</i>	0,04- 0,06	30	0,1 (1) 1,0 (2)
Limón	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0,04- 0,06	7	0,5 (1) 1,0 (2)

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos. (1) Fenpyroximate (2) Hexythiazox

