

STROBISEN 250 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Azoxystrobin	125 g/L.
Flutriafol	125 g/L.
Aditivos.....	c.s.p. 1 L.

Registro PQUA N° 2431-SENASA

AGRO INGENIUM S.A.C.

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
Tel.: 992-773-871

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.
Tel: 86 25 86518999 ext. 836
Fax: +86 25 86455985

AGRO INGENIUM S.A.C.

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
Tel.: 992-773-871

Nº de lote:

Contenido neto: 20 litros

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

STROBISEN 250 SC, con ingredientes activos Azoxystrobin y Flutriafol pertenecen a la familia química delas estrobilurinas y triazoles respectivamente. STROBISEN 250 SC, tiene acción sistémica, translarinar y contacto. Aplicar STROBISEN 250 SC, cuando se prevean lluvias de tal manera que no se produzca lavado de producto y se de un tiempo seco suficiente para que el productos se adhiera a la planta y pueda generar controles satisfactorios.

STROBISEN 250 SC por su activo Azoxystrobin actúa como protector y erradicante con propiedades sistémicas y traslaminares. Inhibe la germinación de esporas al impedir la respiración mitocondrial y por su activo Flutriafol actúa por contacto, sistémico, erradicante y protector. Se absorbe por follaje y se traslada acrópetamente por xilema. Inhibe la síntesis de ergosterol, causando colapso de la pared celular y evitando el crecimiento hifal.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (ml/200l)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
ARROZ	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	400	28	5 ⁺ 1.5 ⁺
VID	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	14	2 ⁺ 0.8 ⁺
TOMATE	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	400	7	0.2 ⁺ 0.3 ⁺
CAFÉ	Roya del cafeito	<i>Hemileia vastatrix</i>	300	30	0.03 ⁺ 0.15 ⁺

PC = Periodo de carencia
Azoxyestrobina

LMR = Límite Máximo de Residuos
**Flutriafol

STROBISEN 250 SC será usado en el control de *Botrytis cinerea* en el cultivo de Vid, se realizará una aplicación cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Realice máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año. Así mismo para el control de *Alternaria solani* en el cultivo de Tomate dos aplicaciones por campaña considerando dos campañas por año. Finalmente para el control de *Pycularia oryzae* en el cultivo de arroz, aplicar una vez por campaña. Para Café aplicar una vez por campaña considerando una campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD: STROBISEN 250 SC, es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: STROBISEN 250 SC, no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

