

22.11 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante a la piel y causa irritación moderada a los ojos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Aryloxyfenoxypropionato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como dolor de cabeza, diarrea, vómito, etc. Dar de beber uno o dos vasos con agua. El vómito sólo debe ser provocado bajo la dirección de un médico. Realizar un lavado gástrico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte.

**TELÉF. EMERGENCIA: SAMU: 106; AGRO KLINGE S.A.: (01) 641-0000.**

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.



- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# HACHE UNO SUPER<sup>®</sup>

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
HERBICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)**

**COMPOSICIÓN:**

Fluazifop-p-butyl..... 175 g/L  
Aditivos..... csp 1L

Reg. N° 167-96-AG-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



**Agro Klinge S.A.**  
Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco  
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulador:

**Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.**  
3 - 15, Edobori, 1- Chome, Nishi-ku  
Osaka 550-0002, Japón  
Telf: 06-6444-7154

Contenido  
Neto: 200 L

N° Lote :  
F. de Formulación:  
F. de Vencimiento:



**NO CORROSIVO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

© Marca Registrada

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:** HACHE UNO SUPER es un herbicida inhibidor de la acetil CoA carboxilasa (ACCCase), sistémico, selectivo, post-emergente, sistémico, selectivo, post-emergente. Se absorbe a través de la superficie de la hoja. Controla malezas gramíneas anuales y perennes en diversos cultivos. HACHE UNO SUPER se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar, uniformemente con cualquier equipo de aspersión, provisto de boquilla de abanico, cuando las malezas presenten 2 a 3 hojas, en suelo húmedo. Repetir la aplicación en casos de que algunas gramíneas perennes pudieran retoñar o hubiera germinación de nuevas semillas de plantas anuales. Evitar la deriva o arrastre de la solución hacia cultivos sensibles.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO                                    | MALEZA                           |  | DOSIS |         | P.C. (días) | L.M.R. (ppm)                |
|--|----------------------------------|--|-------|---------|-------------|-----------------------------|
|  | NOMBRE COMÚN                     | NOMBRE CIENTÍFICO  | L/ha  | ml/200L |             |                             |
| TOMATE                                     | "Grama china"<br>"Grama dulce"   | <i>Sorghum halepense</i><br><i>Cynodon dactylon</i>        | 1-1.5 | 500-750 | 15          | 0.1                         |
| PAPA                                       | "Grama china"                    | <i>Sorghum halepense</i>                                   | 1-1.5 | 500-750 | 15          | 0.1                         |
| CÍTRICOS,<br>MELOCOTÓN<br>MANZANO<br>PALTO | "Gramalote"                      | <i>Panicum purpurascens</i>                                | 1-1.5 | 500-750 | N.A.        | 0.1<br>0.05<br>0.05<br>0.02 |
| VID  | "Pata de gallina"                | <i>Eleusine indica</i>                                     | 1-1.5 | 500-750 | N.A.        | 0.2                         |
| ALGODÓN                                    | "Cadillo"                        | <i>Cenchrus echinatus</i>                                  | 1-1.5 | 500-750 | 15          | 0.1                         |
| CEBOLLA<br>AJO                             | "Rabo de zorro"                  | <i>Setaria geniculata</i>                                  | 1-1.5 | 500-750 | N.A.        | 0.5<br>0.5                  |
| FRIJOL<br>ESPÁRRAGO                        | "Pega pega"<br>"Pajilla"         | <i>Setaria verticillata</i><br><i>Leptochloa uninervia</i> | 1-1.5 | 500-750 | N.A.<br>8   | 5<br>3                      |
| ALFALFA,<br>MARYGOLD                       | "Grama dulce"                    | <i>Cynodon dactylon</i>                                    | 1-1.5 | 500-750 | 15          | N.A.                        |
| PAPRIKA<br>ALCACHOFA                       | "Grama dulce"<br>"Rabo de zorro" | <i>Cynodon dactylon</i><br><i>Setaria geniculata</i>       | 1-1.5 | 500-750 | 45<br>N.A.  | 0.02<br>0.2                 |

P.C. = Período de Carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos / N.D. = No determinado

**NOTA:** Usar la dosis menor en malezas pequeñas y la dosis mayor en malezas desarrolladas con rizomas establecidos.

**VOLUMEN DE APLICACIÓN:** 400 L/ha.

**PERÍODO DE REINGRESO, COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Ver Hoja Informativa adjunta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



32.90