

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Este producto es de CUIDADO. No ingerir.
 Peligroso si es inhalado (aspersión).
 Causa irritación moderada a los ojos.
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
 Conservar el producto en el envase original, bien tapado y etiquetado.
 Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
 Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
 Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Aryloxyphenoxypionate
 No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático.
 En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
 En caso de ingestión, no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente o padece convulsiones.
 En caso de contacto con la piel, retirar la ropa y calzado contaminado, Bañarse con abundante agua y jabón.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.
 En caso de inhalación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
 Teléfonos de Emergencia: • SAMU: 106 • AGRO INGENIUM S.A.C.: 992-773-871

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
 - Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
 - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
 - No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
 - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
 - Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
 - Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
 - El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
 - El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
 - En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar lixiviación hacia aguas subterráneas.

HALOXISEN 108 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Haloxifop-R-methyl..... 108 g/L.
 Aditivos..... C.s.p. 1 L.

Reg. PQUA N° 2430-SENASA

TITULAR DE REGISTRO:

AGRO INGENIUM S.A.C.

RUC: 20601259673
 Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
 Tel.: 992-773-871

FORMULADO POR:

NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

9th Floor, No.58, Nanhu Road, Nanjing 210017 - China.
 Tel: 86 25 86518999 ext. 836
 Fax: +86 25 86455985

IMPORTADO POR:

AGRO INGENIUM S.A.C.

Calle Los Acantos 167, Int. 104, Ate, Lima, Lima - Perú
 Tel.: 992-773-871



Fecha de formulación:

Nº de lote:

Contenido neto: 20 L.

Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

HALOXISEN 108 EC, cuyo ingrediente activo es Haloxifop-R-methyl, es un herbicida selectivo, absorbido por el follaje y las raíces e hidrolizado es trasladado a tejido meristemático e inhibe su crecimiento, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ácidos grasos por inhibición de acetil CoA carboxilasa (ACCase).

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Plaga		Dosis (L/Ha)	Dosis (L/Cil)	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Esparrago	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.3	0.15	28	0.01
Tomate	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.3*	0.19-0.3	N.A.	0.05
Papa	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	0.3	0.15	62	0.01

LMR = Límite Máximo de Residuos

PC = Período de Carencia

N.A. = No aplica

* = Aplicar solo después del trasplante.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Esparrago: Se recomienda máximo 1 aplicación por campaña considerando 2 campañas al año. Las malezas deben estar en post emergencia temprana, se recomienda una aplicación dirigida al área foliar y al suelo. No aplicar en estados avanzados de crecimiento de las malezas.

Tomate: Aplicar después del trasplante, máximo una (01) aplicación por campaña, dos (02) campañas al año.

Papa: Se recomienda aplicar cuando el cultivo aún está sin emerger, las malezas deben estar en post emergencia temprana. Máximo una (01) aplicación por campaña al año.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con agentes oxidantes fuertes.

FITOTOXICIDAD: No evidencia fitotoxicidad si se emplea a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

