

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Piretroide.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y esta hoja informativa.

En caso de contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados estén levantados.

En caso de contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón, incluyendo el cabello y debajo de las uñas. sostén.

En caso de inhalación: Retirar a la persona afectada del lugar de exposición. Controle la respiración, si fuera necesario dar respiración artificial.

Antídoto: No existe antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TRATAMIENTO MEDICO

Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0800-1-3040
CIPROSQUIM: 0800 50847
POINT ANDINA S.A.: (01)348-1018
ESSALUD: 0801-10200

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de

- aplicación; y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- Estado físico :Líquido
- Color :Marrón claro
- Olor :Sin olor
- pH :4.8-6.5
- Densidad :0.91-0.92 gr/ml
- Producto : Inflamable

PRESENTACIONES COMERCIALES: 100ml, 250ml, 500ml, 1 L, 20 L, 200 L.

Titular de Registro, Importado y Distribuido por:
POINT ANDINA S.A
Calle Loreto 304
Urb. Sta Patricia, II tapa
La Molina, Lima - Perú
Teléfono 348-1018/349-9609

Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.
42 St Margarets Grove Twickenham
TW 1 1JG United Kingdom
Teléfono: (44-20) 88923862



APACHE® 25 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Reg. PQUA N° -SENASA


COMPOSICIÓN:

Cypermethrin..... 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1 L

Grupo químico: Piretroide
Nombre químico(IUPAC):
(RS)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl(1RIS)-
cis-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-
dimethylcyclopropanecarboxylate.

Fórmula empírica, peso molecular
C22H19Cl2O3N
PM=416.32

Fórmula estructural



NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



LEA LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

APACHE 25 CE es un insecticida de contacto e ingestión, recomendado para ser usado en el control de plagas de diversos cultivos. Para su aplicación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, luego agregar el producto a aplicar y remover, luego completar con agua hasta su capacidad total, remover y aplicar. La aplicación realizarla con equipo de aspersión sea manual o mecánico tratando de hacer en lo posible una aplicación uniforme.

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y ROPA DE PROTECCIÓN
Para preparar la mezcla, utilizar guantes y botas de goma, delantal, tapabocas y careta de protección. Durante la aplicación, utilizar guantes y botas de goma, overol, máscara o respirador, gafas y gorro.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda las aplicaciones en cualquier etapa del cultivo, cuando se observe la presencia de la plaga. Realizar máximo 01 aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas después de la aplicación.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS

No tiene efecto sobre otros cultivos.

EFFECTO SOBRE CULTIVOS SUCESIVOS Y/O SUSCEPTIBLES

No se han reportado efectos sobre otros cultivos ni susceptibilidad

COMPATIBILIDAD : No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxica usada a las dosis recomendadas en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		PC (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	ml/200 L		
Alfalfa	Gusano ejército	Spodoptera eridania.	0,4	200	15	2
Algodón	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	0,3	150	15	0,2
	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus	0,4	200	15	0,2
Col	Gusano de hoja	Plutella xylostella	0,3	150	15	1
Espárrago	Gusano perforador	Heliothis virescens	0.4-0.5	200-250	7	0,05
Frijol	Gusano medidor	Pseudoplusia includens	0,4	200	15	0,05
Maiz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	0,3	150	15	0,3
Papa	Mosca minadora (adultos)	Liriomyza huidobrensis	0,3	150	15	0,05
Sandía	Perforador de guía	Diaphania nitidalis	0,3	150	15	0,2
Tomate	Polilla	Scrobipalpula absoluta	0,4	200	15	2

PC: Periodo de carencia.

LMR:Límite máximo de Residuos (partes por millón).

