

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **GRUPO QUIMICO:** Acetamidas y Ditiocarbamatos
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, No provoque el vómito. No dar de beber agua a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
Nota al médico: No se conoce antídoto específico, el tratamiento es sintomático y de sostén.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 1-3040**

EsSalud en línea (línea gratuita): 0801-10200- 411-8000, opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------|-------------------------------|---------------|---------|-----------|----------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | Cl 200 l (Kg) | Ha (Kg) | | |
| CEBOLLA | "mildíu" | <i>Peronospora destructor</i> | 0.5 | 1.0 | 7 | 0.05* 1.5** |

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.
Cymoxanil *
Mancozeb **

- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas férticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CUPREX es un fungicida compuesto por dos ingredientes activos mancozeb (fungicida de contacto) y cymoxanil (fungicida preventivo), que le brindan un efecto protector y curativo a la planta. Se recomienda usar **CUPREX** para el control de enfermedades producidas por hongos oomycetos como "mildíu" *Peronospora destructor*.

Preparación:

Hacer una pre mezcla en una reducida cantidad de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

COMPATIBILIDAD

CUPREX es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina, hacer una pequeña prueba en una reducida cantidad de agua antes de hacer la mezcla completa.

FITOTOXICIDAD

CUPREX no es fitotóxico si es usado a las dosis y usos recomendados en la presente etiqueta.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar el primer síntoma de enfermedad del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas antes de las 24 horas después de la aplicación

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

CUPREX®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRICOLA FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición:

Cymoxanil 80 g/kg
Mancozeb 640 g/kg
Aditivos c.s.p1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular de Registro:

PRODUCTOS CAMPO-AGRO PERÚ S.A.C.
Av. Los Mirtos 239. Lince, Lima 14. Perú.
Telefono: 00 51 -1 - 222-2795

Formulado:

NINGBO GENERIC CHEMICAL CO., LTD.
Romm 512, Shidai Square, N° 8, Lengjing Street, Ningho 315010, Zhejiang, P.R. China.
Telefono: + 86 - 574 - 87301088

Importado y Distribuido por:

PERU FERTIL E.I.R.L.
JR. NEON N° 5681 ZONA INDUSTRIAL INFANTAS,
LOS OLIVOS - LIMA - Peru
Teléfono: + 51 - 949 - 845 - 833

Contenido neto: 25 Kg.

N. de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

GENERIC
your exclusive agrochemical partner

