

- Este producto es DANINO. No ingerir.

- Peligroso si es inhalado. Evitar respirar (aspersión).

- Causa irritación moderada a los ojos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.

- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos.

INSECTICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Emamectin benzoate	100 g/kg
Lufenuron	400 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N°2438-SENASA

Titular del Registro:

Formulado por:
AGROHOL COMPANY LTD.
Rm601, No.1, Green Land Technology Square,
Lane 58, East Xujiajin Road, Shanghai, China.

Importado y Distribuido por:
SERFI S.A.
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima - Perú
Telef.: 710-4068

Contenido Neto: 200 g

Lote N°:

Fecha de Form.:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para organismos artrópodos.
- No contaminar ríos, estanques y arroyos con los desechos de envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

y luego agregar el resto de agua en el tanque de aplicación. Es necesario que el equipo esté en buenas condiciones, bien calibrado y cuente con un buen sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS (kg/1000 L)	PA (diás)	L.M.R. (g/L)	
	Nombre Común	Nombre Científico			Emamectin benzoate	Lufenuron
Espárrago	Zogüero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.055	7	0.01	0.02
Maíz	Zogüero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.05 - 0.075	35	0.01	0.01
Peprika	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.055	7	0.02	0.8
Tomate	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	0.055-0.060	7	0.02	0.4

P.C.: Período de Carencia. L.M.R.: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Aplicar cuando los abejeros estén en una etapa inicial, es decir, cuando el grado de infestación sea lo suficientemente moderado.
Aplicar un máximo de 01 aplicación por campaña. Se debe rotar con otros insecticidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO
No ingresar a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
SIR-ONE® no es compatible con ácidos fuertes ni productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

EXHIBICIÓN PARA USO ETIQUETA