

48,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

1,0 ± 0,3

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico si se ingiere o se inhala.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados. No exponer a radiación solar.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Durante el transporte y manipulación, proteger de la luz solar y alta temperatura.
- No utilizar el producto en áreas contaminadas, y para regar en la zona tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, lavar la boca con agua abundante y beber abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, no proporcionar nada a una persona inconsciente. Busque inmediatamente atención médica.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos, cubriendo que los párpados estén levantados. Buscar atención médica si persiste irritación.
- En caso de irritación, retirar a la persona del área contaminada y trasladarla a un ambiente ventilado y a la sombra. Aplicar respiración artificial si es necesario.
- Antibiótico. No tiene antibiótico específico. Tratamiento sintomático.

SAMU: 106

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces con agua abundante.
- Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Desactive el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- No reutilice el envase para otros fines.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- No permitir animales en las zonas tratadas.
- No contaminar ríos, estuarios o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para combatir la deriva.
- Evitar el uso de equipos de aspersión en días de viento fuerte.
- En caso de derrame, lavar el área afectada y desinfectarla por las autoridades locales para este fin.



AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Activos : c.s.p. 1 L

Trichoderma harzianum cepa 22 (min 1 x 10⁹ u.f.c./ml) : 10 g/L

Reg. N° 075 - SENASA - PEA - ACBM



Importado y Distribuido por:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Tiular del Registro:
SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Calle Arg. 222, Miraflores,
Lima, Perú
Tel.: (01) 617-3300

Contenido Neto: 4 L

N° de Lote:
F. de Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Formulado por:
BIOTECNOLOGICOS S.A. (BIOTECRAM)
Calle Arg. 222, Miraflores,
Lima, Perú
Tel.: (01) 617-3300

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

T-22 es un fungicida biológico, a base del organismo vivo esporas del hongo *Trichoderma harzianum* cepa 22, T-22 tiene como mecanismo de acción la competencia, parasitismo, competencia y antagonismo inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento de los micorganismos micopatógenos.

Método de aplicación: Utilice equipo de aplicación terrestre. Aplicar igual al tiempo de aplicación hasta recomendarse la dosis y la capacidad y véntase la dosis indicada del producto T-22 con los aplicadores en movimiento como en el caso de la aplicación aérea. Realizar previamente la calibración del equipo de aplicación. El producto debe ser conservado en su envase original. Es estable por al menos 6 meses bajo condiciones de refrigeración.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C.	L.M.R.
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARANDANO	Muñe regresiva	<i>Lasioglyphis thricarbore</i>	1.0 - 2.0	N.A.	N.A.
PALTO	Muñe regresiva	<i>Lasioglyphis thricarbore</i>	1.0 - 2.0	N.A.	N.A.
VID	Ortilla	<i>Erysiphe necator</i>	2.0 - 3.0	N.A.	N.A.

N.A.: No aplica

L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Para los cultivos de arándano, vid y palto, realizar las aplicaciones al detectar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas con humedad relativa superior al 80% y temperatura superior a 15°C. En caso de aplicación aérea, aplicar en condiciones de viento favorable y sin lluvia. Aplicar en condiciones de alta temperatura, no aplicar en caso de riesgo de lluvia. Aplicar de preferencia al amanecer o de noche.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso de se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección personal.

COMPATIBILIDAD

T-22 no se debe aplicar con productos químicos que contengan los siguientes ingredientes activos: Benomil, Imazalil, Propiconazol, Tebuconazol y Triflumizol.

No mezclar con agua clorada, coque, ácidos inorgánicos, ni productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de uso, podrá ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El usuario debe ser responsable de los daños ocasionados por el uso del producto. El usuario debe ser responsable de los daños ocasionados por el uso del producto. El usuario debe ser responsable de los daños ocasionados por el uso del producto.

