

$1,0 \pm 0,31$

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
T-22® es un fungicida biológico, a base del organismo vivo esporas del hongo *Trichoderma harzianum* cepa 22. T-22® tiene como mecanismo de acción la antibiosis, parasitismo, competencia y antagónico inhibiendo la germinación de las esporas y el crecimiento de los micelios de los fitopatógenos.

Método de aplicación: Utilice equipo de aplicación terrestre. Añadir agua al tanque del equipo de aplicación hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. Añadir los ingredientes secos al tanque. Añadir los ingredientes líquidos al tanque. Llevar el tanque a la zona de aplicación. Disfrutar, manteniendo la aplicación uniforme. La dosis indicada del producto es 1.232 con los ingredientes secos. Los ingredientes líquidos se añaden a la dosis indicada del producto.

- Método de aplicación: Utilice equipo de aplicación terrestre. Añadir agua al tanque del equipo de aplicación hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y viértase la dosis del producto T-22® con los agitadores en movimiento, complementando luego el agua restante. Realizar previamente la calibración del equipo de aplicación con una prueba en blanco empleando solo agua.

AVANCE	Muerte regresiva	N.A.	N.A.
PALTO	Muerte regresiva	1.0 - 2.0	N.A.
Q	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.0 - 2.0	N.A.

- | PALTO | Muerte regresiva | <i>Lasiodiplodia theobromae</i> | 1.0 - 2.0 | N.A. |
|-------|------------------|---------------------------------|-----------|------|
| VID | Odiolosis | <i>Erysiphe necator</i> | 2.0 - 3.0 | N.A. |

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

Puede reintegrar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el período, deberá usar equipo de protección.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro

- RESPONSABILIDAD CIVIL**
- La aplicación de estos superiores a sus servitudes en el cuadro de usos, podrán ocasionar responsabilidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis servitadas en el cuadro de usos.
- E) Thylor del Ecuador aconseja que los sembradíos se hagan al menos del arbolado existente o los sembradíos se alineen y se vea

es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
ADAPTA					

ARANDANO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.0 - 2.0	N.A.
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.0 - 2.0	N.A.

PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	1.0 - 2.0	N.A.
MIP	0.43 ± 0.02	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.0 - 0.0	N.A.

P.C.: Período de Carenza	N.A.: No aplica	L.M.R.: Límite máximo de residuos
--------------------------	-----------------	-----------------------------------

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

favorables para el desarrollo de la enfermedad, preferiblemente de forma preventiva. Al ser de origen biológico se puede aplicar más de (02) aplicaciones por campaña/año en los cultivos de arándano, vid y paltó. Evitar condiciones de alta temperatura, no aplicar en caso de riesgo de lluvia. Aplicar de preferencia al

COMBATIBILIDAD

Puede reintegrar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido el periodo, deberá usar equipo de protección.

FITOTOXICIDAD
La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

PREVALENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Para los cultivos de arándano, vid y paltó, realizar las aplicaciones al detectar los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas son favorables para el desarrollo de la enfermedad, preferiblemente de forma preventiva. Al ser de origen biológico se puede aplicar más de (02) aplicaciones por campaña en los cultivos de arándano, vid y paltó. Evitar condiciones de alta temperatura, no aplicar en caso de riesgo de lluvia. Aplicar con preferencia al amanecer o atardecer.

PERÍODO DE REINGRESO